

**Libro Rojo de Mamíferos Amenazados
de la Argentina**



La presente es una publicación de la Sociedad Argentina
para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), Argentina.

Libro Rojo de Mamíferos Amenazados de la Argentina

**Ricardo A. Ojeda, Verónica Chillo
y Gabriela B. Díaz Isenrath**
Editores

**SAREM
2012**

Libro Rojo de Mamíferos Amenazados de la Argentina

Ricardo A. Ojeda, Verónica Chillo y Gabriela B. Diaz Isenrath
Editores

Diseño de tapa: Benjamín Bender

Diseño interior, compaginación y corrección: Silvina L. Pereyra (Servicio de
Diseño Gráfico, CCT CONICET Mendoza)

Impreso en Argentina - *Printed in Argentina*
ISBN En trámite
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
© SAREM, 2012

Contenido

Prólogo	7
Autores contribuyentes.....	9
Antecedentes, categorías y criterios	19
Antecedentes	19
Directrices UICN	23
Categorías y criterios	33
El estado de los mamíferos de la Argentina: síntesis de la evaluación regional del Libro Rojo 2012	43
Lista Roja.....	49
Orden Didelphimorphia	49
Orden Paucituberculata	58
Orden Microbiotheria	58
Orden Pilosa	59
Orden Cingulata.....	61
Orden Chiroptera	67
Orden Primates.....	81
Orden Carnivora	87
Orden Perissodactyla.....	116
Orden Artiodactyla	117
Orden Cetacea.....	129
Orden Rodentia.....	142
Orden Lagomorpha.....	193
Especies extintas y amenazadas	195
<i>Láminas</i>	
Proyectos de conservación de especies	199
Sitios web de interés	221
Literatura citada.....	217
Índice de especies.....	247

ORDEN RODENTIA

FAMILIA: Sciuridae

R. A. Ojeda

Sciurus aestuans Linnaeus Ardilla gris

Categoría Nacional 2012: NT

Categoría Nacional 2000: LC

Categoría Nacional 1997: LC dependiente de la conservación

Categoría Global UICN 2010: LC

Comentarios: El cambio de categoría obedece a una mayor reducción de superficie y deterioro en la calidad de la matriz ambiental de la selva Paranense. Estas características, asociadas a atributos de dieta y modo de vida (frugívoro/granívoro, escansorial), y que sus poblaciones representan los límites australes de su rango geográfico, constituyen factores potenciales de extirpación local de la especie y que merece particular atención en el futuro próximo.

Sciurus ignitus (Gray) Ardilla de las Yungas

Categoría Nacional 2012: NT

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Nacional 1997: LC dependiente de la conservación

Categoría Global UICN 2010: DD

Comentarios: El cambio de categoría obedece a una mayor reducción de superficie y deterioro en la calidad de la matriz ambiental de la selva de Yungas. Estas características, asociadas a atributos de dieta y modo de vida (frugívoro/granívoro, escansorial) y que sus poblaciones representan los límites australes de su rango geográfico, constituyen factores potenciales de extirpación local de la especie y que merece particular atención en el futuro próximo.

FAMILIA: Cricetidae

P. Teta y U. F. J. Pardiñas

***Abrawayaomys chebezi* Pardiñas, Teta y D'Elía**
Ratón espinoso

G. Gil, P. Teta y U. F. J. Pardiñas

Categoría Nacional 2012: EN B1ab (i,iii)

Categoría Nacional 1997 y 2000: DD (*Abrawayaomys ruschii*)

Categoría Global 2011: NE

Comentarios: Especie conocida a partir de un ejemplar coleccionado en el norte de la provincia de Misiones y unos pocos restos hallados en egagrópilas de lechuzas en esta misma provincia (Pardiñas et al., 2009a). Probablemente también esté presente en el sur de Brasil. Presumiendo una distribución fragmentada, se asume una postura precautoria (UICN 2001).

***Abrothrix andina* (Philippi)**
Ratón andino

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC (*Akodon andinus*)

Categoría Global 2011: LC

***Abrothrix illutea* Thomas**
Ratón gris grande

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: NT (*Akodon illuteus*)

Categoría Global 2011: NT

Comentarios: A pesar de su reducido rango de extensión, *A. illutea* es una especie localmente común, medianamente abundante en muestreos realizados en bosques y selvas montanas de Tucumán y Catamarca (Teta et al., 2011a).

Abrothrix jelskii* (Thomas)*Ratón tricolor****Categoría Nacional 2012: DD**Categoría Nacional 1997 y 2000: DD (*Chroeomys jelskii*)

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: En la Argentina esta especie es conocida para una sola localidad en la provincia de Jujuy, que además es la localidad típica de la forma nominal *Akodon bacchante sodalis* Thomas, 1913 (Teta et al., 2006).

Abrothrix lanosus* (Thomas)*Ratón colorado****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 2000: DD

Categoría Nacional 1997: LC (*Akodon lanosus*)

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Feijoo et al. (2010) han resumido el conocimiento que existe para esta especie, destacando su presencia en más de una docena de localidades en Santa Cruz, Tierra del Fuego y sur de Chile.

Abrothrix longipilis* (Waterhouse)*Ratón de pelos largos****Categoría Nacional 2012: LC**Categoría Nacional 1997 y 2000: LC (*Akodon longipilis*)

Categoría Global 2011: LC

Abrothrix olivacea* (Waterhouse)*Ratón oliváceo****Categoría Nacional 2012: LC**Categoría Nacional 1997 y 2000: LC (*Akodon olivaceus*)

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: conspecifica con *A. xanthorhinus*

Abrothrix sanborni* (Osgood)*Ratón negruzco****Categoría Nacional 2012: DD**Categoría Nacional 1997 y 2000: DD (*Akodon sanborni*)

Categoría Global 2011: NT

Comentarios: Para la Argentina, existe un único registro en las cercanías del Lago Quillén, provincia de Neuquén (Pearson, 1995).

Akodon albiventer* Thomas*Ratón ventriblanco****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Akodon aliquantulus* Díaz, Barquez, Braun y Mares*Ratón diminuto****Categoría Nacional 2012: NE**

Categoría Nacional 2000: VU B1

Categoría Nacional 1997: L

Categoría Global 2011: DD

Comentarios: Recientemente sinonimizada con *A. caenosus* (Jayat et al., 2010).

Akodon azarae* (Fischer)*Ratón de campo****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Akodon boliviensis* (Meyen)*Ratón plumizo****Categoría Nacional 2012: DD**

Categoría Nacional 2000: NE

Categoría Nacional 1997: LC

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie recientemente registrada en la Argentina, con poblaciones en pastizales de altura de la provincia de Salta (Jayat et al., 2010).

Akodon budini* (Thomas)*Ratón de Calilegua****Categoría Nacional 2012: DD**Categoría Nacional 2000: NT (*Hypsimys budini*)

Categoría Nacional 1997: NT

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie poco conocida, a veces confundida con *A. fumeus* (e.g., Díaz y Barquez, 2007). Hasta hace poco considerada endémica de la Argentina, recientemente ha sido registrada en Bolivia (Smith y Patton, 2007).

Akodon* cf. *A. cursor* (Winge)*Ratón pardo-rojizo****Categoría Nacional 2012: DD**Categoría Nacional 2000: LC (*Akodon cursor*)

Categoría Nacional 1997: NT

Categoría Global 2011: LC

Akodon dolores* Thomas*Ratón cordobés****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: NT

Categoría Global 2011: LC

Akodon fumeus* (Thomas)*Ratón ahumado****Categoría Nacional 2012: DD**

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Restringida al sector norte de las Yungas, en las provincias de Jujuy y Salta (Jayat et al., 2010).

Akodon iniscatus* Thomas*Ratón patagónico****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 2000: NT

Categoría Nacional 1997: LC

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: La distribución de esta especie ha sido resumida por Pardiñas (2009), quien ha reportado poblaciones sobre un amplio territorio de la Patagonia extra andina argentina, desde Neuquén y el sur de Buenos Aires hasta el noreste de Santa Cruz.

Akodon leucolimnaeus* Cabrera*Ratón catamarqueño****Categoría Nacional 2012: NE**

Categoría Nacional 2000: DD

Categoría Nacional 1997: NE

Categoría Global 2011: DD

Comentarios: Recientemente sinonimizada con *A. spegazzini* (Jayat et al., 2010).

Akodon molinae* Contreras*Ratón pajizo****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Probablemente conespecífica con *Akodon dolores* (Braun et al., 2008).

***Akodon montensis* Thomas**
Ratón selvático

Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: NE
Categoría Global 2011: LC

***Akodon neocenus* Thomas**
Ratón pajizo

Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 2000: DD
Categoría Nacional 1997: LC
Categoría Global 2011: DD

***Akodon oenos* Braun, Mares y Ojeda**
Ratón del vino

Categoría Nacional 2012: NE
Categoría Nacional 1997 y 2000: NE
Categoría Global 2011: DD

Comentarios: Especie conocida únicamente para tres localidades en la provincia de Mendoza. Recientemente sinonimizada con *A. spegazzini* (Pardiñas et al., 2011).

***Akodon paranaensis* Christoff, Fagundes, Sbalqueiro,
Mattevi y Yonenaga-Yassuda**
Ratón paranaense

Categoría Nacional 2012: DD
Categoría Nacional 1997 y 2000: NE
Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Registrada para una única localidad en la provincia de Misiones.

***Akodon philipmyersi* Pardiñas, D' Elfa, Cirignoli y Suarez**
Ratón de los yerbatales

U. F. J. Pardiñas, P. Teta y G. Gil

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: DD

Comentarios: Especie conocida para dos localidades en el sur de la provincia de Misiones, en la ecorregión de Campos y Malezales. A pesar de su aparentemente reducido rango de presencia, las escasas evidencias disponibles sugieren que esta especie es todavía frecuente (y a juzgar por su presencia moderadamente abundante en la dieta de las lechuzas) en parches de pastizal insertos en una matriz de campos cultivados, indicando tal vez cierta resiliencia a la degradación del ambiente. El área ocupada por este ratón ha sido alterada por actividades agrícolas y ganaderas desde al menos el siglo XVI. Por último, y considerando que esta especie ha sido recientemente descrita, no sería improbable que referencias previas pudieran corresponderle (e. g., la mención de "Akodontini" por parte de Massoia [1983] para la localidad de Los Limonales).

***Akodon polopi* Jayat, Ortíz, Salazar-Bravo, Pardiñas y D'Elía**
Ratón serrano

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: NE

Comentarios: Especie recientemente descrita; localmente común en pastizales serranos de las provincias de Córdoba y San Luis (Jayat et al., 2010).

***Akodon serrensis* Thomas**
Ratón paranaense

U. F. J. Pardiñas, P. Teta y G. Gil

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 2000: DD (*Akodon reigi*)

Categoría Nacional 1997: DD

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie varias veces citada para Argentina, confundida con *A. paranensis* o mencionada a partir de ejemplares de referencia actualmente perdidos. Existen al menos dos registros confirmados para la provincia de Misiones, uno publicado y otro todavía inédito (Pereira et al., 2005; Pardiñas, datos no publicados). Su historia natural en el extremo austral de su extensión es desconocida, así como su distribución finamente delineada. Se requiere más información para una categorización adecuada, aunque investigaciones futuras demuestren que pudiera corresponderle una clasificación de amenazada.

***Akodon simulator* Thomas**
Ratón de vientre gris

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

***Akodon spegazzinii* Thomas**
Ratón de las Yungas

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 2000: LC

Categoría Nacional 1997: DD

Categoría Global 2011: LC

Akodon sylvanus* Thomas*Ratón jujeño****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: LC

Akodon toba* Thomas*Ratón chaqueño****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 2000: NT

Categoría Nacional 1997: DD

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie de amplia distribución en el Chaco Seco de Argentina, con poblaciones desde Jujuy y Formosa hasta Santiago del Estero y Chaco (P. Teta, datos no publicados).

Andalgalomys olrogi* Williams y Mares*Laucha colilarga gris****Categoría Nacional 2012: VU B1ab(iii)**

Categoría Nacional 1997 y 2000: VU B1

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie poco conocida, con poblaciones aparentemente aisladas en las provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis.

Andinomys edax* Thomas*Rata andina****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Auliscomys sublimis* (Thomas)*Pericote andino****Categoría Nacional 2012: DD**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie poco conocida en Argentina, con escasos registros para las provincias de Salta y Jujuy.

Bibimys chacoensis* (Shamel)*Ratón de hocico rosado chaqueño****Categoría Nacional 2012: NT**

Categoría Nacional 2000: VU B1

Categoría Nacional 1997: LC

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie de distribución disyunta, con poblaciones en el Chaco Húmedo y el sur de Misiones. Seguramente amenazada por el avance de la frontera agrícola y la conversión de los pastizales naturales a agroecosistemas.

Bibimys torresi* Massoia*Ratón de hocico rosado común****Categoría Nacional 2012: VU B2ab(ii, iii)**

Categoría Nacional 2000: VU B1

Categoría Nacional 1997: DD

Categoría Global 2011: NT

Comentarios: Su inclusión en la categoría B2 se justifica por su rango de extensión menor a 2000 km². Evidencias subfósiles indican que hasta hace menos de 200 años sus poblaciones se extendían al menos hasta el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ocupando seguramente todo el litoral rioplatense de esta provincia.

***Blarinomys breviceps* (Winge)**
Ratón musaraña

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: DD

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie indicada para la provincia de Misiones a partir de su hallazgo en egagrópilas de aves rapaces. Su presencia requiere confirmación a través de ejemplares trampeados.

***Brucepattersonius guarani* Mares y Braun**
Hocicudito guaraní

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: DD

Comentarios: Especie de dudosa situación taxonómica. Su diagnosis incluye caracteres individualmente y ontogenéticamente variables.

***Brucepattersonius misionensis* Mares y Braun**
Hocicudito misionero

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: DD

Comentarios: Especie de dudosa situación taxonómica. Su diagnosis incluye caracteres individualmente y ontogenéticamente variables.

***Brucepattersonius paradisus* Mares y Braun**
Hocicudito del paraíso

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: DD

Comentarios: Especie de dudosa situación taxonómica. Su diagnóstico incluye caracteres individualmente y ontogenéticamente variables.

***Calomys boliviae* (Thomas)**
Laucha vespertina boliviana

Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: NE
Categoría Global 2011: LC

***Calomys callidus* (Thomas)**
Laucha vespertina mesopotámica

Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: DD
Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Según muestreos recientes, una forma grande de *Calomys*, putativamente referida como *C. callidus*, es dominante en las comunidades de micromamíferos en los agroecosistemas del sur de la provincia de Entre Ríos (Massa, 2010).

***Calomys callosus* (Rengger)**
Laucha vespertina grande

Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: LC
Categoría Global 2011: LC

***Calomys laucha* (Fischer)**
Laucha vespertina chica

Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: LC
Categoría Global 2011: LC

Calomys lepidus* (Thomas)*Laucha vespertina andina****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 2000: LC

Categoría Nacional 1997: VU B1

Categoría Global 2011: LC

Calomys musculus* (Thomas)*Laucha vespertina bimaculada****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Calomys venustus* (Thomas)*Laucha vespertina cordobesa****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: LC

Chelemys macronyx* (Thomas)*Ratón topo grande****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Delomys dorsalis* (Hensel)*Ratón listado****Categoría Nacional 2012: DD**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie registrada en unas pocas localidades en la provincia de Misiones, probablemente por ser propia de selvas primarias y

poco intervenidas. Documentada por primera vez en la década de 1960, no fue vuelta a mencionar sino hasta el año 2005 (Pereira et al., 2005).

Deltamys kemp Thomas

Ratón del Delta

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 2000: LC

Categoría Nacional 1997: VU B1 (*Akodon kemp*)

Categoría Global 2011: LC

Eligmodontia bolsonensis Mares, Braun, Coyner
y Van Den Bussche

Laucha colilarga de los bolsones

C. Lanzone, P. Teta y U. F. J. Pardiñas

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: NE

Comentarios: Especie recientemente descrita (Mares et al., 2008); su historia natural es poco conocida. Inicialmente registrada en menos de 10 localidades en las provincias de Catamarca y Salta. Más recientemente, haplotipos referidos a esta especie han sido documentados para ejemplares del norte de Patagonia (Da Silva, 2011), lo que podría extender su rango de distribución más de 1500 km hacia el sur. Se requiere más información para una categorización adecuada, aunque investigaciones futuras demuestren que pudiera corresponderle una clasificación de amenazada.

Eligmodontia hirtipes (Thomas)

Laucha colilarga de patas peludas

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: NE

Comentarios: Especie poco conocida en la Argentina, con posibles registros para las provincias de Salta y Jujuy; a veces confundida con *E. puerulus*.

***Eligmodontia moreni* (Thomas)**
Laucha colilarga baya

Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: LC
Categoría Global 2011: LC

***Eligmodontia morgani* J.A. Allen**
Laucha colilarga patagónica

Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: LC
Categoría Global 2011: LC

***Eligmodontia puerulus* (Philippi)**
Laucha colilarga puneña

Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 1997 y 2000: LC
Categoría Global 2011: LC

***Eligmodontia typus* F. Cuvier**
Laucha colilarga común

Categoría Nacional 2012: LC
Categoría Nacional 2000: LC
Categoría Nacional 1997: DD
Categoría Global 2011: LC

Euneomys chinchilloides* (Waterhouse)*Ratón peludo castaño**

C. Lanzone, A. Novillo, U. F. J. Pardiñas y P. Teta

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: DD

Euneomys mordax* Thomas*Ratón peludo oscuro**

C. Lanzone y A. Novillo

Categoría Nacional 2012: VU B1ab (iii)

Categoría Nacional 1997 y 2000: DD

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie escasamente conocida, tal vez por ocupar una de las ecorregiones menos muestreadas de la Argentina, como es el caso de los Altos Andes. Su presencia se conoce para cinco localidades restringidas a esta cordillera. En el sudoeste de Mendoza es moderadamente abundante en algunos análisis de egagrópilas (Pardiñas et al., 2008b).

Euryoryzomys legatus* (Thomas)*Colilargo acanelado salteño**

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC (*Oryzomys legatus*)

Categoría Global 2011: LC

Euryoryzomys russatus* (Wagner)*Colilargo de las Yungas**

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: LC

Geoxus valdivianus* (Philippi)*Ratón topo pardo****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Graomys centralis* (Thomas)*Pericote chaqueño**

C. Lanzone, A. Novillo, U. F. J. Pardiñas y P. Teta

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: NE

Comentarios: Recientemente sinonimizado con *G. chacoensis* (Lanzone et al., 2007; Ferro y Martínez, 2009).

Graomys domorum* (Thomas)*Pericote pálido****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Graomys edithae* Thomas*Pericote riojano****Categoría Nacional 2012: DD**

Categoría Nacional 1997 y 2000: DD

Categoría Global 2011: DD

Comentarios: Especie de dudosa situación taxonómica, conocida únicamente para la localidad tipo y no vuelta a registrar desde su descripción en 1919.

Graomys griseoflavus* (Waterhouse)*Pericote común****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Gyldenstolpia fronto chacoensis* (Gyldenstolpe)*Rata acuática grande****Categoría Nacional 2012: EX**Categoría Nacional 1997 y 2000: DD (*Kunsia fronto*)

Categoría Global 2011: NE

Comentarios: *G. f. chacoensis* no se ha vuelto a registrar desde 1896, año en el que se colectó el holotipo y único ejemplar conocido de este taxón (Pardiñas et al., 2008b).

Holochilus brasiliensis* (Desmarest)*Rata nutria o colorada****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Holochilus chacarius* Thomas*Rata nutria chaqueña****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Irenomys tarsalis* (Philippi)*Colilargo oreja negra****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

***Juliomys pictipes* (Osgood)**
Ratón arborícola colorado

G. Gil, P. Teta y U. F. J. Pardiñas

Categoría Nacional 2012: EN B1ab(i,iii)

Categoría Nacional 1997 y 2000: DD (*Wilfredomys pictipes*)

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie poco conocida, con cuatro localidades de registro para la provincia de Misiones. Descrita en 1933, su presencia en territorio misionero recién fue vuelta a documentar casi ocho décadas más tarde (Pardiñas et al., 2009b). Presumiendo una distribución fragmentada y su aparente restricción a selvas primarias, se asume una postura precautoria (UICN, 2001).

***Loxodontomys micropus* (Waterhouse)**
Pericote sureño

P. Teta, U. F. J. Pardiñas, C. Lanzzone y A. Novillo

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 2000: LC (*Auliscomys micropus*)

Categoría Nacional 1997: NE

Categoría Global 2011: LC

***Loxodontomys pikunche* Spotorno, Cofre, Manriquez,
Vilina, Marquet y Walker**
Pericote chileno

A. Novillo, C. Lanzzone, P. Teta y U. F. J. Pardiñas

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie conocida para una única localidad en el sudoeste de Mendoza, donde sería simpátrida con *L. micropus* (Novillo et al., 2009). La situación taxonómica de esta forma es incierta; su holotipo es

un compuesto entre un cráneo de *Phyllotis xanthopygus* y una piel de *Loxodontomys*. Cañón et al. (2010) y Teta et al., 2011b, han sugerido su potencial conespecificidad con *L. micropus*.

***Necomys amoenus* (Thomas)**

Ratón ventriblanco

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie con un registro para Argentina en las cercanías de la frontera entre Bolivia y la provincia de Salta (Jayat et al., 2006).

***Necomys benefactus* (Thomas)**

Ratón pampeano

Categoría Nacional 2012: NE

Categoría Nacional 2000: LC

Categoría Nacional 1997: NE

Categoría Global 2011: LC

***Necomys lactens* (Thomas)**

Ratón ventrirufo

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: DD (*Bolomys lactens*)

Categoría Global 2011: LC

***Necomys lasiurus* (Lund)**

Ratón de cola peluda

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC (*Bolomys lasiurus*)

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: incluye en su sinonimia a las formas nominales *benefactus* y *temchuki* (D'Elía et al., 2008).

Necromys obscurus* (Waterhouse)*Ratón oscuro****Categoría Nacional 2012: LC**Categoría Nacional 1997 y 2000: LC (*Bolomys obscurus*)

Categoría Global 2011: NT

Comentarios: aunque a nivel global ha sido categorizado como NT, su rango de distribución ha sido recientemente ampliado con el registro de nuevas poblaciones en el sudeste de la provincia de Buenos Aires (Teta et al., 2010). Localmente común, es incluso frecuente en áreas con intervención antrópica, como bordes de campos cultivados y pastizales periurbanos (Fornés y Massoia, 1965; Dalby, 1975).

Necromys temchuki* (Massoia)*Ratón del nordeste****Categoría Nacional 2012: NE**Categoría Nacional 1997 y 2000: LC (*Bolomys temchuki*)

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: sinónimo de *N. lasiurus****Nectomys squamipes* (Brants)****Rata nadadora****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Neotomys ebriosus* Thomas*Ratón de las vegas****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: NT

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie escasamente conocida, probablemente porque su hábitat es uno de los menos muestreados de la Argentina. Trampeos y

análisis recientes de egagrópilas indican una amplia distribución, desde Jujuy hasta Catamarca, con poblaciones moderadamente abundantes en las ecorregiones de la Puna y los Altos Andes.

***Notiomys edwardsii* (Thomas)**
Ratón topo chico

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: VU B1

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: En el actual conocimiento de la especie, con casi 50 localidades de registro para las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, su consideración como especie VU resulta injustificada. En algunos sectores (e.g., Meseta de Somuncurá, Río Negro) resulta moderadamente abundante, al menos según lo indican los análisis de egagrópilas de aves rapaces (Pardiñas et al., 2008b).

***Oecomys* sp.**
Ratón colilargo de los árboles

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: DD (*Oecomys concolor*)

Categoría Global 2011: NE

Comentarios: La situación taxonómica de las poblaciones argentinas de *Oecomys* ha sido discutida por Cirignoli et al. (2006). Recientemente, Carleton et al. (2009) han sugerido su potencial pertenencia a *O. mamorae*; sin embargo, una comparación preliminar con ejemplares de Bolivia referidos a este último taxón revela varias diferencias morfológicas y métricas significativas con aquellos del Chaco oriental argentino.

***Oligoryzomys brendae* Massoia**
Colilargo de Brenda

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: DD

***Oligoryzomys chacoensis* (Myers y Carleton)**
Colilargo chaqueño

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

***Oligoryzomys destructor* (Tschudi)**
Colilargo grande

Categoría Nacional 2012: NE

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie de presencia improbable en la Argentina; evidencias morfológicas y genéticas sugieren que en el noroeste de este país estaría presente una sola forma grande del género, a la que le correspondería el nombre de *O. brendae* (P. Teta et al., datos sin publicar).

***Oligoryzomys flavescens* (Waterhouse)**
Colilargo chico

Categoría Global 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

***Oligoryzomys fornesi* (Massoia)**
Colilargo menor

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC (*Oligoryzomys microtis*)

Categoría Global 2011: LC

***Oligoryzomys longicaudatus* (Bennet)**
Colilargo patagónico

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

***Oligoryzomys nigripes* (Olfers)**
Colilargo de bandas anaranjadas

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 2000: LC

Categoría Nacional 1997: DD

Categoría Global 2011: LC

***Oxymycterus akodontius* Thomas**
Hocicudo negro

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: DD

Categoría Global 2011: DD

Comentarios: Especie de situación taxonómica dudosa, conocida únicamente para la localidad tipo. Sin registros desde su descripción en la década de 1920.

***Oxymycterus misionalis* Sanborn**
Hocicudo grande de Misiones

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 2000: DD

Categoría Nacional 1997: NE

Categoría Global 2011: NE

Comentarios: Massoia et al. (2006) registraron a este hocicudo en por lo menos 23 localidades de Misiones, con poblaciones continuas en el norte y centro del territorio provincial. Algunos de estos registros corresponden incluso a sectores con moderada a severa degradación antrópica. Para estos autores es “tal vez el más común de los hocicudos misioneros, pero no por ello abundante. Fue registrado en el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Urugua-í”. Si a esto se suma su potencial conespecificidad con la mucho más ampliamente distribuida *O. quaestor* (véase Musser y Carleton, 2005), no hay razones para pensar que esta especie se encuentre amenazada, al menos en lo inmediato.

***Oxymycterus paramensis* Thomas**
Hocicudo parameño

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 2000: LC

Categoría Nacional 1997: DD

Categoría Global 2011: LC

***Oxymycterus rufus* (Fischer)**
Hocicudo rojizo

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

***Oxymycterus wayku* Jayat, D'Elía, Pardiñas, Miotti y Ortiz**
Hocicudo wayku

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: NE

Comentarios: Especie conocida para cuatro localidades en Tucumán, en áreas de Yungas entre 800 y 2400 m (Jayat et al., 2008)

***Phyllotis alisosensis* Ferro, Martínez y Barquez**
Pericote de los alisos

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: NE

Comentarios: Especie endémica de la Argentina, conocida para dos localidades en el extremo austral de las Yungas. Su situación taxonómica, en especial con respecto a *P. anitae*, requiere nuevas aproximaciones. Se requiere más información para una categorización adecuada, aunque investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera corresponderle.

***Phyllotis anitae* Jayat, D'Elía, Pardiñas y Namen**
Pericote de Anita

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: DD

Comentarios: Especie endémica de la Argentina, conocida únicamente para la localidad tipo, en un área de ecotono entre pastizales de neblina y bosques montanos. Muy rara en su área de captura y probablemente endémica del extremo sur de las Yungas (Jayat et al., 2007). Se requiere más información para una categorización adecuada, aunque investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera corresponderle.

***Phyllotis caprinus* Pearson**
Pericote anaranjado

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NT

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie poco conocida y escasamente representada en colecciones, restringida en su distribución a unas pocas localidades en las provincias de Jujuy y Salta.

***Phyllotis osilae* J.A. Allen**
Pericote del pastizal

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: NT

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: *P. osilae* se distribuye desde Salta y Jujuy hasta Catamarca, ocupando típicamente pastizales de neblina y áreas ecotonales. Muestreos recientes sugieren que sus poblaciones son medianamente abundantes en varios sectores de su rango distribucional (Jayat y Pacheco, 2006).

Phyllotis xanthopygus* (Waterhouse)*Pericote panza gris****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 2000: LC

Categoría Nacional 1997: DD

Categoría Global 2011: LC

Pseudoryzomys simplex* (Winge)*Rata de los esteros****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 2000: NT

Categoría Nacional 1997: DD

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Pardiñas et al. (2004) han constatado la presencia de esta especie, hasta hace poco considerada rara, en más de una veintena de localidades en el Chaco Húmedo.

Reithrodon auritus* (Fischer)*Rata conejo****Categoría Nacional 2012: LC**

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global 2011: LC

Reithrodon typicus* Waterhouse*Rata conejo**

P. Teta, U. F. J. Pardiñas y N. Muzzachiodi

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: LC

***Rhipidomys austrinus* Thomas**
Colilargo peludo

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 2000: NT

Categoría Nacional 1997: DD

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie escasamente conocida, con poblaciones restringidas a las Yungas de las provincias de Salta y Jujuy.

***Salinomys delicatus* Braun y Mares**
Ratón de las salinas

D. Rodríguez, C. Lanzone, P. Teta y U. F. J. Pardiñas

Categoría Nacional 2012: VU B2ab(ii,iii)

Categoría Nacional 1997 y 2000: VU B1

Categoría Global 2011: DD

Comentarios: En los últimos años se han registrado cuatro nuevas localidades que ampliaron la extensión del área de presencia para esta especie, calculada en aproximadamente 69.795 km² en cinco provincias del centro-oeste de la Argentina (Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza) (Ojeda et al., 2001; Lanzone et al., 2005; Rodríguez et al., 2012). Contra esto, su área de ocupación es probablemente menor de 2000 km², ya que está mayormente restringida a ambientes de salares con una compleja estructura de arbustos (Rodríguez et al., 2012). A pesar de que esta especialización de hábitat lleva a una distribución muy fragmentada de sus poblaciones, tres de las ocho localidades de presencia pertenecen al mismo sistema ecológico (Desaguadero). El hecho de que los salares son sistemas con fuertes prácticas de manejo (ej. cultivo de olivares en el salar de Pipanaco), sugieren que la situación de esta especie podría cambiar a alguna categoría mayor de amenaza en el corto plazo.

***Scapteromys tumidus* Thomas**
Rata acuática

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC (*Scapteromys aquaticus*)

Categoría Global 2011: LC

***Sooretamys angouya* (Fischer)**
Colilargo

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: LC

***Tapecomys primus* Anderson y Yates**
Ratón de Tapequa

C. Lanzone, A. Novillo, P. Teta y U. F. J. Pardiñas

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: LC

Comentarios: Especie conocida para dos localidades en la provincia de Jujuy, en ambientes forestados con presión antrópica. Su situación con respecto a las poblaciones argentinas reconocidas como *T. wolffsohni* no es del todo clara; se requiere que los materiales referidos a estas especies sean revisados integralmente. Es necesaria más información para una categorización adecuada, aunque investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera corresponderle.

***Tapecomys wolffsohni* (Thomas)**
Pericote de Wolffsohn

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NE

Categoría Global 2011: NE

Comentarios: Especie con escasos registros para las provincias de Jujuy y Salta; citada varias veces para la Argentina y en no pocas ocasiones a partir de ejemplares posteriormente referidos a *P. caprinus* o *P. xanthopygus* (Díaz et al., 2006). Se requiere más información para una categorización adecuada, aunque investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera corresponderle.

***Thaptomys nigrita* (Lichtenstein)**

Ratón subterráneo

Categoría Nacional 2012: DD

Categoría Nacional 1997 y 2000: NT (*Akodon nigrita*)

Categoría Global 2011: LC

FAMILIA: Erethizontidae

R. A. Ojeda

Estas especies de coendúes, como otros especialistas de hábitat, modo de vida y dieta (arborícolas, frugívoros/herbívoros) que alcanzan en las selvas subtropicales de la Argentina (Yungas y Paranense) sus límites australes de distribución, presentan bajas densidades poblacionales, que sumado al paisaje selvático fragmentado y deteriorado, presentan una mayor vulnerabilidad de extinción local. Su distribución merece ser monitoreada.

***Coendou bicolor* (Tschudi)**

Coendú de espinas negras

Categoría Nacional 2012: VU A2c; B1+2c

Categoría Nacional 1997 y 2000: VU A2c; B1+2c

Categoría Global UICN 2010: LC

***Coendou prehensilis* (Linnaeus)**

Coendú grande

Categoría Nacional 2012: VU A2c; B1+2c

Categoría Nacional 1997 y 2000: VU A2c; B1+2c

Categoría Global 2012: LC