



EL PICAFLOR ZAFIRO (*Thalurania furcata*) Y EL COLIBRÍ MEDIANO (*Colibri serrirostris*) EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA

Diego Ortiz^{1,2} y Rodrigo Aráoz^{1,2}

¹ Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces. Reserva Experimental Horco Molle, Facultad de Ciencias Naturales e IML. Tucumán, Argentina. Correo electrónico: aves77-99@hotmail.com.

² Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e IML. Tucumán, Argentina.

El 29 de enero de 2015, en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, a 2.500 m s.n.m. fotografiamos dos especies de colibríes poco frecuentes de observar en la provincia. Estas especies pueden pasar desapercibidas, ser subobservadas o confundidas, especialmente si se trata de hembras o juveniles. Ambas especies fueron registradas en el mismo lugar, pero en distintos horarios durante la mañana, sin que se observen interacciones entre ellas. Ambos ejemplares se alimentaban de flores de Salvia (*Salvia* sp.).

El Picaflor Zafiro (*Thalurania furcata*) habita en Argentina, selvas y bosques del noroeste y noreste (Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes y Misiones) (Olrog, 1959) con dos ecotipos, *T. f. baeri* que habita en el noroeste y *T. f. eriphile* que se encuentra en el noreste (Corrientes y Misiones) (De la Peña, 2012). Es citada para Tucumán en base a una única observación de una pareja registrada entre los meses de enero a abril, y en septiembre de 1952, en jardines de la ciudad de San Miguel de Tucumán (Olrog, 1953), por lo que el registro que aquí presentamos es el primero que documenta con fotos la presencia de esta especie en la provincia.

En el Picaflor Zafiro las partes inferiores, cuello, pecho y vientre de las hembras son de un color grisáceo blancuzco (Olrog, 1959; Meyer de Schauense, 1970; Meyer de Schauense y Phelps 1978; De la Peña y Rumboll, 1998; Narosky e Yzurieta, 2003; Souza, 2004; Rodríguez Mata, Erize y Rumboll, 2006). Este carácter puede generar confusión con hembras del Picaflor de Barbijo (*Heliomaster furcifer*) aunque éstas últimas poseen tonalidades más grises y marrones en la garganta y pecho, además de tener un pico más largo que el zafiro y con una leve curvatura en el extremo y contar con una mancha blanca característica detrás de los ojos. Estos aspectos son difíciles de diferenciar en una observación rápida de un ejemplar en

movimiento, lo que propicia la confusión a la hora de identificar estas especies. Olrog (1959) comenta que la cola es el carácter más distintivo para reconocer a las hembras del Picaflor Zafiro, ya que si bien éstas poseen la cola furcada, es mucho menor que la del Picaflor de Barbijo. Todos los autores mencionados anteriormente comparten como destacable el detalle de que la punta de las caudales poseen el ápice blanco, pero este color solo está presente en las tres timoneras externas, y se observa tanto ventral como dorsalmente. Es importante destacar que Meyer de Schauense (1970) menciona que la cola es azulada, carácter distintivo que ayudaría también a diferenciarla de la hembra del Picaflor de Barbijo, que posee una cola negruzca. Otro carácter a destacar para la identificación de las hembras de zafiro es la región de la corona de color cobrizo (Meyer de Schauense, 1970; Rodríguez Mata *et al.*, 2006). Estos caracteres mencionados por la bibliografía, concuerdan muy bien con el ejemplar observado y fotografiado en Tafí del Valle (Figura N° 1).

El Colibrí Mediano (*Colibri serrirostris*) frecuente en Argentina bosques, bordes de selvas y sabanas (Narosky e Yzurieta, 2003) del noroeste en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, y del noreste en Misiones, norte de Corrientes, Santa Fe y Córdoba (De la Peña, 2012). Lucero (1983) comenta que en la provincia de Tucumán habita en matorrales y es muy local en su distribución. Si bien existen cinco pieles depositadas en la colección de aves de la Fundación Miguel Lillo, solo tres poseen localidad de colecta y son muy antiguas, la más nueva es la de un macho colectado en el año 1960 en la localidad de las Mesadas (Antelo y Brandán Fernández, 2013), posiblemente esta localidad se encuentra en el Parque Nacional Los Alisos. Otros dos ejemplares fueron colectados en la localidad de Alpachiri, ambas localidades de colectas están a 1.800 m s.n.m.




Figura N° 1. El Picaflor Zafiro (*Thalurania furcata*), en Tafi del Valle 29 de enero de 2015. Caracteres: 1) Corona cobriza. 2) Ventralmente gris-blancuzco. 3) Ápices de las tres timoneras externas blancas. 4) Cola furcada. 5) Dorso verde. 6) Rabadilla más azulada. 7) Timoneras centrales verdes. Fotografías: Rodrigo Aráoz.

No se cuenta con nuevas localidades de colecta, ni publicaciones recientes de registros de esta especie en la provincia, por lo que esta observación y documentación reafirma su presencia, y como se trata de un juvenil, es probable que la especie nidifique en la provincia.

En el Colibrí mediano los dos sexos son idénticos, aunque las hembras son más pálidas (Narosky e Yzurieta, 2003). El plumaje de los ejemplares adultos es muy característico y distintivo de la especie. Lo que no mencionan la mayoría de las guías de aves, y que es lo que lleva a la confusión en la identificación, son los plumajes de individuos inmaduros, el mismo puede durar poco tiempo hasta lograr el plumaje definitivo. El ejemplar fotografiado si bien se trata de un inmaduro (Figura N° 2), posee características distintivas de la especie con plumaje adulto, pero no se encuentra muy desarrollado y es más apagado en sus tonalidades de colores. Posee penacho auricular azul-violeta, predomina el color azul pero apagado y se observan algunas plumas violetas. Tiene el babero

verde con reflejos azules, también con baja tonalidad, la región ventral inferior es de color blanca (Rodríguez Mata *et al.*, 2006), no posee la garganta azul ni notable mancha ventral (Narosky e Yzurieta, 2003), caracteres que podrían hacer que se confunda con el Colibrí Grande (*Colibri coruscans*). Las subcaudales son de color blanco (Rodríguez Mata *et al.*, 2006; Narosky e Yzurieta, 2003) que según De la Peña y Rumboll (1998) solo se observa desde abajo, descripción que concuerda con las fotografías tomadas desde distintas posiciones del ave. Souza (2004) describe el plumaje del inmaduro, resaltando que posee el vientre blanquecino y una lista malar blanca, caracteres resaltantes en el individuo observado.

La mancha blanca detrás del ojo y en las subcaudales son rasgos que están presentes en individuos inmaduros y adultos, mientras que los otros caracteres distintivos de colores van apareciendo paulatinamente, son tenues y opacos hasta llegar al plumaje maduro más brillante.




Figura N° 2. Colibrí Mediano (*Colibri serrirostris*), en Tafi del Valle 29 de enero de 2015. Caracteres: 1) Mancha blanca detrás del ojo. 2) Púrpuro debajo de las mejillas. 3) Parche púrpura azul. 4) Línea malar blanca. 5) Sin garganta azul, babero verde con reflejos azules. 6) Ventral blanco. 7) Ápice ventral de la cola blanco. Fotografías: Rodrigo Aráoz.

BIBLIOGRAFÍA

ANTELO, C. Y Z. BRANDÁN FERNÁNDEZ. 2013. *Las aves no Passeriformes de Tucumán, Argentina*. Miscelanea 132, Fundación Miguel Lillo, Argentina.

DE LA PEÑA, M. R. 2012. *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: informe preliminar*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad, N°7. Ediciones Biológicas. 770 pp.

DE LA PEÑA, M. Y M. RUMBOLL. 1998. *Birds of Routh America and Antartica*. Harper Collins Publisbers.

LUCERO, M. M. 1983. *Lista y distribución de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán*. Miscelanea, 61, Fundación Miguel Lillo, Tucumán.

MEYER DE SCHAUENSE, R. 1970. *A Guide to the Birds of South America*. The Academy of Natural Sciences of Philadelphia.

MEYER DE SCHAUENSE, R. Y J. H. PHELPS JR. 1978. *A Guide to the Birds of Venezuela*. Princenton University Press, Princenton, New Jersey.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2003. *Guía para la identificación de aves de Argentina y Uruguay*. Vazquez Manzini Editores, 346 pp.

OLROG, C. C. 1953. Sobre aves del noroeste argentino. *Hornero*, 10 (1): 84-85.

OLROG, C. C. 1959. *Las aves argentinas*. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.

RODRÍGUEZ MATA, J. F. ERIZE Y M. RUMBOLL. 2006. *Guía de campo Collins. Aves de Sudamérica. No Passeriformes*. Letemedia casa editora: Harper Collins Publishers.

SOUZA, D. 2004. *Todas as aves do Brasil, Guia de campo para identificacao*. Editora Dall.

Recibido: 21 de mayo de 2015
Aceptado: 24 de agosto de 2015