

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE



REVISTA CHILENA DE ANTROPOLOGÍA

Nº 29
I^{er} SEMESTRE 2014

ISSN 0716-3312 (Versión impresa)
ISSN 0719-1472 (Versión en línea)

Editor General y Línea Arqueología

Andrés Troncoso
(Departamento de Antropología, Universidad de Chile).

Editor Línea Antropología

Andrés Gómez
(Departamento de Antropología, Universidad de Chile)

Editor Línea Bioantropología

Sergio Flores
(Departamento de Antropología, Universidad de Chile)

Editores Asociados

Isabel Cartajena, Patricio López y Boris Santander

Ayudante de Edición

Antonia Escudero

Comité Editorial

Hugo Benavides (Fordham University, Estados Unidos)
Luis Alberto Borrero (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)
Luis Jaime Castillo (Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú)
Josepa Cucó (Universidad de Valencia, España)
Pedro Paulo Funari (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)
Alfredo González Ruibal (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España).
Enrique Luque (Universidad Autónoma de Madrid, España)
Rosamel Millamán (Universidad Católica de Temuco, Chile)
Andrés Recasens (Corporación de Desarrollo de las Ciencias Sociales, Chile)
Horacio Sabarots (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Charles Stanish (Cotsen Institute of Archaeology, University of California, Estados Unidos)

Revista Chilena de Antropología es una publicación del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Es una revista internacional arbitrada por pares académicos que se publica dos veces al año (Julio y Diciembre) y que recibe manuscritos inéditos en español o inglés. Su objetivo es difundir y discutir la investigación en las diferentes ramas de la Antropología, con el fin de comprender los múltiples aspectos de las realidades sociales y culturales de Latinoamérica y el Caribe. Para ello, la revista recibe contribuciones durante todo el año y se estructura dos secciones diferentes: Artículos y Reseñas.

Artículos se compone de contribuciones relacionadas con los diferentes ámbitos de la Antropología, los que aborden problemáticas sociales y culturales, a partir de reflexiones teóricas, proposiciones metodológicas y/o casos de estudio, privilegiando una mirada crítica tanto de la realidad como de las ciencias sociales. **Reseñas** corresponde a recensiones de libros de interés a cualquier campo de la Antropología. Estas pueden referirse tanto a publicaciones **de libros, monografías o investigaciones publicadas de no más de 5 años de antigüedad.**

Revista Chilena de Antropología se encuentra indizada y/o resumida en:

- * Latindex Catálogo
- * Anthropological Literature
- * IBSS (International Bibliography of Social Sciences)
- * CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades)

Este volumen es una edición del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile
Consultas y suscripciones deben dirigirse a:
Revista Chilena de Antropología
Departamento de Antropología
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Chile
Av. Ignacio Carrera Pinto 1045 – Ñuñoa
Santiago, Chile
E-mail: rchant@uchile.cl
<http://www.revistadeantropologia.uchile.cl>

Índice

Editorial Revista Chilena de Antropología	8
Editorial Zooarqueología en Latinoamérica: Estado de la cuestión	9
Artículos	
1.- La Arqueozoología en Latinoamérica: Una Prospección de su Estado Actual <i>Eduardo Corona-M. y Joaquín Arroyo-Cabrales</i>	11
2.- La Arcillosa 2: Registro Zooarqueológico de la Ocupación Humana durante el Holoceno Medio, Tierra del Fuego, Argentina <i>Mónica Salemme, Fernando Santiago y Jimena Oria</i>	19
3.- Concheros Arqueológicos en la Costa Uruguaya: Revisión y Perspectivas <i>Laura Beovide y Sergio Martínez</i>	26
4.- El Rol Económico de los Recursos Malacológicos durante el Holoceno Medio en la Costa Arreica del Norte de Chile: Sitio Agua Dulce <i>Laura Olguín</i>	32
5.- Moluscos en Contextos Arqueológicos de la Costa Atlántica de Tierra del Fuego: Consumo Prehistórico e Implicancias de su Distribución Actual <i>Fernando Santiago, Sandra Gordillo y Mónica Salemme</i>	40
6.- Biodiversity of Marine Molluscs from Sambaqui da Tarioba, Rio Das Ostras, Rio De Janeiro (Brazil) <i>Raquel Garofalo de Souza Faria, Edson Pereira da Silva y Rosa Cristina Corrêa Luz de Souza</i>	49

7.- Biodiversity of Marine Fishes from Shellmounds of Ilha Grande Bay, Rio de Janeiro, Brazil <i>Augusto Barros Mendes, Edson Pereira Silva y Rosa Cristina Corrêa Luz Souza</i>	55
8.- Experimentación Sobre los Efectos de la Meteorización en la Supervivencia de Elementos Óseos de <i>Percichthys Trucha</i> .: Implicaciones Ictioarqueológicas para el Sitio DVI, Lago Musters (Prov. Chubut, Argentina) <i>Ariadna Svoboda y Eduardo J. Moreno</i>	60
9.- Patrón de Explotación de Tinámidos en la Costa Atlántica Norpatagónica (Argentina) durante el Holoceno Tardío. <i>Hernán Marani y Florencia Borella</i>	68
10.- Los Gasterópodos del Sector B del Sitio Alero Deodoro Roca, Valle De Ongamira (Córdoba, Argentina): Un Análisis Preliminar. <i>Andrés D. Izeta, Thiago Costa, Sandra Gordillo, Roxana Cattáneo, Gabriella Boretto, Andrés Robledo</i>	74
11.- Microarqueología Aplicada al Análisis e Interpretación de Termoalteraciones en Restos Óseos de Tortugas de Sitios Arqueológicos en el Caribe Colombiano <i>Elizabeth Ramos Roca y Lina María Campos Quintero</i>	81
12.- Estudios sobre Meteorización de Huesos en Patagonia <i>Isabel Cruz</i>	89
13.- La Tafonomía en la Zooarqueología Argentina de los Últimos Veinte Años: Su Representación en las Publicaciones Periódicas y Reuniones Académicas Nacionales. <i>Mariana Mondini y Sebastián Muñoz</i>	95

14.- Estado Actual de las Investigaciones Tafonómicas Naturalistas en Punta Entrada y Monte León (Patagonia Meridional) <i>Sebastián Muñoz e Isabel Cruz</i>	102
15.- Restos de Anfibios en la Costa de la Araucanía: Problematicación y Perspectivas <i>Daniel Quiroz L. e Ismael Martínez R</i>	109
16.- Una Aproximación Tafonómica a los Restos de Peces en Laguna Llanquanelo (Mendoza) <i>Mercedes Corbat</i>	116
17.- Autopodios de Guanacos en Sitios Arqueológicos: Equifinalidad entre lo Palatable y lo Preservado <i>Laura Miotti y Laura Marchionni</i>	122
18.- Explotación Industrial de Pinnípedos en la Factoría de Bahía Tethis (Tierra del Fuego, Argentina): Una Aproximación Zooarqueológica <i>Martín Vázquez y Fernando Santiago</i>	130
19.- Análisis del Registro Arqueofaunístico de Grupos Cazadores-Recolectores del Holoceno Tardío de la Llanura Aluvial del Paraná Medio (Sitio Los Bananos, Departamento Goya, Corrientes, Argentina) <i>María Carolina Barboza y Maite Martín</i>	136
20.- Explotación de Materia Prima Ósea en la Pampa de las Lagunas Santafesinas: El Sitio Laguna El Doce (Provincia de Santa Fe, Argentina) <i>Jimena Cornaglia Fernández y Natacha Buc</i>	141

Una Aproximación Tafonómica a los Restos de Peces en Laguna Llancaleño (Mendoza)

A Taphonomic Approach to Fish Remains at Llancaleño Lagoon (Mendoza)

Mercedes Corbat¹

RESUMEN

El origen de las acumulaciones de restos de peces en contextos arqueológicos de ambientes lacustres requiere un análisis que contemple un posible aporte no humano. Este es el caso del conjunto recuperado en el sitio Llan 50, al oeste de la laguna Llancaleño (Mendoza, Argentina). El objetivo general de este trabajo es contribuir al conocimiento de los procesos involucrados en la formación del conjunto ictioarqueológico de este sitio, con la intención de determinar si estos restos se depositaron primordialmente de forma natural o como consecuencia de la acción humana. Para ello, se comparan los patrones hallados en el registro arqueológico de Llan 50 con aquellos observados en acumulaciones naturales de peces en la misma área de estudio. Se reconocen características potenciales de los depósitos naturales en Llancaleño y se distinguen aquellos criterios válidos para diferenciar el origen de un conjunto en este contexto, los que sugerirían un origen principalmente antrópico para el conjunto arqueológico de Llan 50.

Palabras clave: Ictioarqueología, Laguna, Mendoza, Tafonomía.

ABSTRACT

The study of fish remains accumulations in archaeological contexts near to lacustrine environments requires an analysis that considers possible non-human contributions. This is the case of fish bone assemblages recovered from Llan 50 site, on the western margin of Llancaleño lagoon (Mendoza, Argentina). This paper aims to explore the processes involved in the formation of this ichthyoarchaeological assemblage, determining whether these remains were deposited naturally or as a result of human action. Consequently, the composition of bone assemblages of Llan 50 are compared with those observed for fish natural accumulations at the same study area. Natural deposits' potential characteristics from Llancaleño are recognized and some useful criteria to differentiate the assemblage origin in this context are distinguished, which would suggest mainly an anthropic origin for the archaeological assemblage Llan 50.

Key words: Ichthyoarchaeology, Lagoon, Mendoza, Taphonomy.

¹ CONICET- Asociación de Investigaciones Antropológicas. Bartolomé Mitre 1131 7° G - C1036AAU. Correo-e: mercedescorbat@yahoo.com.ar

Recibido: 04-12-2012 – Revisado: 30-12-2013 – Aceptado: 27-04-2014

INTRODUCCIÓN

En las proximidades de la laguna Llancaleño, al sur de Mendoza, se han hallado restos de peces en contextos arqueológicos, resultando Llan 50 (Giardina *et al.* 2011), sobre su margen izquierda, el sitio con la mayor evidencia ictioarqueológica registrada hasta el momento (Corbat 2011). Sin embargo, el origen de las acumulaciones de restos de peces en contextos arqueológicos próximos a las costas de ambientes lacustres requiere un análisis que contemple un posible aporte no humano (Zohar *et al.* 2001), especialmente porque este tipo de ecosistemas tiende a acumular huesos de peces en agregados más densos que la mayor parte de los ecosistemas terrestres (Stewart 1991). El objetivo general del trabajo es contribuir al conocimiento de los procesos involucrados en la formación de los conjuntos ictioarqueológicos de Llancaleño (figura 1) –y específicamente de Llan 50– con la intención de determinar si los restos de peces en este sitio se depositaron principalmente de forma natural o como consecuencia de la acción humana. El trabajo permite incrementar nuestro conocimiento acerca de los depósitos naturales de una de las especies más representadas en los conjuntos ictioarqueológicos de Patagonia (*Percichthys trucha*) (Svoboda 2013) y discutir los criterios utilizados para distinguir el origen natural o cultural de este tipo de registro.

ENFOQUE TEÓRICO-METODOLÓGICO

Varios estudios han intentado discernir entre estos dos tipos de agentes –natural o antrópico– en la conformación de conjuntos de peces (Colley 1990, Wheeler y Jones 1989, Stewart 1991, Butler 1993, 1996; Zohar *et al.* 2001, entre otros) y han sugerido algunos criterios tentativos resumidos por Zohar *et al.* (2001). En este trabajo se toman en consideración algunos de estos criterios para comparar los datos obtenidos del análisis de un conjunto de peces depositado naturalmente y de un conjunto ictioarqueológico (Llan 50) con aquellos de la comunidad viva de la laguna y los cursos de agua que allí desembocan (tabla 1). De esta forma pretendemos generar una primera aproximación a la composición de los conjuntos de peces en este contexto depositacional particular, previo al enterramiento, y evaluar qué tan fielmente un registro de este tipo es representativo de la comunidad viva (Behrensmeyer y Dechant Boaz, 1980; Stewart, 1991; Zohar *et al.*, 2008). Asimismo, buscamos comprender la conformación del conjunto arqueológico Llan 50 y enmarcar nuestras interpretaciones sobre el mismo.

		Esqueleto axial			Esqueleto Apendicular										
		Cabeza Cervical	Tronco		Estilopodio	Zuopodios	Autopodio				Cinturas	Otras			
					Anterior (húmero)	Posterior (húmero)	Anterior (radio)	Posterior (radio)	Anterior (carpales)	Posterior (metacarpo)	Metacarpo (falanges)	Escapular	Pélvica	Ribón	Serraniformes
Capa 4 CN ¹	NISP ²	61	16	31	11	16	21	28	12	26	64	4	0	0	0
	MNI ³	5	4	13	3	5	7	5	0	9	4	0	0	0	0
	MAU ⁴	1	2	4	1,5	2,5	3,5	2,5	4	2,5	2	0	0	0	0
Cueva Marije	NISP ²	25	50	100	37,5	62,5	62,5	87,5	62,5	100	66,25	50	0	0	0
	MNI ³	21	2	6	3	6	21	28	4	7	40	2	0	0	7
	MAU ⁴	3	2	5	3	4	5	7	2	1	6	2	0	0	7
Capa 3 CN ¹	NISP ²	1,5	0,4	0,21	1	2	2,5	3,5	1	0,5	1,5	1	0	0	0,44
	MNI ³	37,5	0,21	5,21	20	10	62,5	87,5	25	12,5	37,5	25	0	0	10,9
	MAU ⁴	12	5	9	3	4	13	21	8	14	51	4	5	1	0
Capa 2 CS ¹	NISP ²	2	2	3	3	1	2	5	3	3	10	4	3	1	0
	MNI ³	1	2	2	1,5	0,5	1	0,5	1,5	1,5	2,5	2	1,5	0,5	0
	MAU ⁴	40	80	80	60	20	40	20	60	60	100	80	60	20	0
AEP-1	NISP ²	34	9	24	29	9	25	23	31	53	199	1	1	0	19
	MNI ³	4	3	7	4	2	4	4	7	14	25	1	1	0	19
	MAU ⁴	2	0,6	0,43	2	1	2	2	3,5	7	3,5	0,5	0,5	0	1,19
Los Toldos	NISP ²	28,57	8,57	6,12	28,57	14,29	28,57	28,57	50	100	80	7,14	7,1	0	17
	MNI ³	253	36	315	65	19	52	30	119	119	162	22	5	10	0
	MAU ⁴	42	26	155	33	13	28	19	90	58	53	22	5	10	0
Capa 67 ²	NISP ²	21	3,7	8,1	16,5	6,5	14	9,5	6,4	5,8	13,2	11	2,5	2	0
	MNI ³	100	17,6	39,5	78,5	31	66,6	45,2	39,4	27,6	62,6	12	23,8	0	0
	MAU ⁴														

¹ Datos extraídos de Marchionni 2012 ms.
² Datos extraídos de Motti 1998.
³ Corresponde a la suma de todos los especímenes de elementos óseos que conforman la región anatómica.
⁴ Corresponde al valor máximo exhibido por alguno de los elementos óseos para dicha región.




Figura 1.: Localización del área de estudio.
 Figure 1: Location of the study area.

Especie	Hábitat y características generales
Odontesthes hatcheri Pejerrey patagónico	En otras lagunas aparece en las playas y en el centro (Mac Donagh y Thormählen, 1945). En Llancaleño es más frecuente en las nacientes (donde aparecen los más grandes, de hasta 29 cm) y en la laguna (menores a 10 cm) (YPF, 2009). Suele desplazarse en cardúmenes. Se destaca la calidad de su carne.
Percichthys trucha Perca criolla	Generalmente al medio de la laguna (Mac Donagh y Thormählen, 1945; YPF, 2009). No se capturó en la desembocadura ni litoral. Especie económicamente importante que alcanza hasta 55 cm.
Jenynsia multidentata Madrecitas de agua	Muy común en aguas superficiales. No supera los 9,5 cm de longitud total.
Trichomytherus areolatus Bagreco del torrente	Los juveniles preferirían aguas cercanas a las orillas y se ubican entre o debajo de piedras y detritus. Pueden alcanzar hasta 30 cm.
Cheirodon interruptus Mojarrá	Abunda en aguas mansas de arroyos y ríos. Carece de valor comercial. Puede alcanzar los 6 cm.

Tabla 1: Características de la comunidad viva de peces de la Laguna Llancaleño

Table 1: Characteristics of the living fish community at Llancaleño Lagoon.

Las criterios aquí considerados son: a) la diversidad taxonómica: estimación de la cantidad de taxones identificados; b) la representación de partes esqueléticas, previa identificación anatómica. Los porcentajes de supervivencia se calcularon dividiendo la frecuencia observada para cada sector (cráneo o postcráneo) por la frecuencia esperada. Ésta se obtiene al multiplicar el MNI de la muestra por las veces que las unidades anatómicas aparecen en el esqueleto; c) las modificaciones óseas, observando macroscópicamente la existencia de alteraciones; d) la densidad de huesos y de individuos, estimadas al dividir la cantidad de especímenes por la superficie recorrida (depósito actual) o por el volumen excavado (conjunto arqueológico) y el MNI por estos mismos valores, respectivamente; y e) tamaño corporal, estimado a partir de la comparación de las vértebras, basioccipitales y faríngeos hallados con los mismos elementos de individuos de tamaño corporal conocido. La elección de los elementos responde a los de mayor representación arqueológica, exceptuando aquellos –como los otolitos– cuyo estado no permite una correcta valoración de su dimensión original, al menos macroscópicamente.

PRESENTACIÓN DE LOS CONJUNTOS ANALIZADOS

Conjunto de peces actuales depositado naturalmente

El conjunto consiste en 29 carcasas de peces depositadas naturalmente por un descenso significativo del agua de la laguna, proceso que habría comenzado un año antes de la recolección (junio 2011), pero de ocurrencia cíclica. Fue recuperado en la costa norte de la laguna, en el sector inundable de playa, con suelos poco permeables y salinos. El estado de preservación es variable, tratándose generalmente de ejemplares bastante completos y articulados, que incluso presentan parte del cuero y de la carne en estado seco (figura 2).



Figura 2: Carcasa de una de las percas (*Percichthys trucha*) depositadas naturalmente.

Figure 2: One of the perch (*Percichthys trucha*) carcass naturally deposited.

Conjunto ictioarqueológico de Llancañelo 50

Llan 50 (35°44'3,1"LS-69°12'10,8"LO) es un sitio a cielo abierto ubicado aproximadamente a 7 km al oeste de la laguna salina de Llancañelo (1346 msnm) y a menos de 1 km de los pozos de agua dulce de Carapacho. Se sitúa sobre la planicie fluvio-lacustre, en una zona kárstica alejada del sector de playa y cercana a los bajos salinos inundables.

Con una superficie excavada de 2m², se destaca la elevada cantidad de materiales líticos y restos óseos de aves pequeñas, microvertebrados y peces (Giardina et al., 2011), a lo largo de una secuencia que se extiende hasta los 3000 años AP. Estos últimos están representados por los 1105 especímenes aquí analizados.

RESULTADOS

Diversidad taxonómica

En el conjunto natural, solamente se registró una especie (*Percichthys trucha*) de las cuatro presentes en la laguna (tabla 1). Por otro lado, la única especie identificada en el conjunto ictioarqueológico de Llancañelo es *Odontesthes hatcheri*, mientras que el 56% de los especímenes –mayoritariamente vértebras– permanecen taxonómicamente indeterminados (tabla 2). Esto se debe principalmente

a problemas de identificación relacionados con la ausencia de rasgos diagnósticos en determinados elementos de los peces (Wheeler y Jones, 1989; Colley, 1990), o su desaparición –por problemas de fragmentación, erosión, termoalteración– en algunos

de los restos arqueológicos. Si bien los especímenes indeterminados podrían corresponder a algunas de las otras especies, sólo se puede afirmar con certeza la presencia de pejerreyes.

Elemento	Odontesthes sp.	Indet.	Total
Basioccipital	9 (1)	3 (1)	12 (2)
Ceratohial	4	0	4
Faríngeo	16	4	20
Opercular	1	0	1
Otolito	100 (2)	41	141 (2)
Vértebra	356 (113)	507 (202)	863 (315)
Indet.	0	64 (8)	64 (8)
Total	486 (116)	619 (211)	1105 (327)

Tabla 2: Abundancia anatómica y taxonómica (NISP) del conjunto ictioarqueológico Llan 50. Entre paréntesis, cantidad de restos termoalterados.

Table 2: Anatomic and taxonomic abundance (NISP) at Llan 50 ichthyoarchaeological assemblage. Quantity of burned remains in brackets.

Representación de elementos esqueléticos

Los individuos del depósito natural actual se encontraban bastantes enteros, representándose tanto su parte craneal como la postcraneal, aunque la mayoría de las carcasas presentaba el sector caudal incompleto (65,5%) o ausente (13,8%). Agrupando los elementos óseos por sectores, los huesos más representados en este conjunto fueron los del neurocráneo –con la mayor supervivencia (79%)– seguidos por el sector precaudal de la columna (78%). Entre los sectores con menor supervivencia se encuentran el esqueleto apendicular (55%), la serie orbital (49%) y el sector caudal de la columna (47%), lo que probablemente se relacione con la acción de carroñeros.

En el conjunto ictioarqueológico se han recuperado principalmente vértebras (sector postcraneal) y otolitos (sector craneal), predominando las primeras (tabla 2). Si analizamos el %MNE de Llan 50, observamos que abundan los restos postcraneales (80,4%) en clara contraposición a lo observado para los depósitos naturales recientes, cuyo segmento caudal está representado

en aproximadamente un 30% (Stewart, 1991; Stewart y Gifford-González, 1994; Butler, 1993).

Modificaciones óseas

No hemos advertido modificaciones diagnósticas en los elementos óseos del conjunto natural actual, excepto algunas fisuras y quebraduras, principalmente en preoperculares –con grietas radiales en su hoja (24%), bordes aserrados más pronunciados (20,7%) e incluso algunos “dientes” quebrados (14%)–, operculares –en la porción adosada a la espina (14%)–, etmoides (17%) y arcos vertebrales. Aunque sin registro directo, no puede descartarse una acción carroñera por parte de algunas especies de aves.

En los especímenes de peces recuperados en el sitio Llan 50 no se han registrado marcas de corte ni señales de corrosión por ácidos estomacales. La termoalteración está presente en casi el 30% de los restos.

Densidad huesos/individuos

En el depósito natural, la densidad de hallazgos fue relativamente baja (aproximadamente un individuo por cada 4m²). Promediando la cantidad de elementos encontrados por individuo, representaría una densidad aproximada de 15 NISP/m². Sin embargo, considerando los individuos representados por mayor y menor cantidad de elementos, el rango de densidades de hallazgos por superficie se extiende desde un máximo de casi 23 NISP/m² hasta un mínimo de 2,5 NISP/m². Por otro lado, en el conjunto ictioarqueológico la densidad es relativamente elevada (551,5 especímenes por m³), estimándose 55,1 NISP/m³ por nivel en promedio. No obstante, la densidad varía en cada nivel, abarcando un rango de 145,5 NISP/m³ (nivel 3) hasta 2,5 NISP/m³ (nivel 9). A lo largo de toda la secuencia, se contabilizó un MNI=71 en los 2m³.

Tamaño corporal

En el conjunto natural únicamente se recuperaron percas de 25 a 35 cm de largo, lo que representa un rango de tamaños relativamente acotado para la especie (tabla 1). Entre los individuos de Llan 50 -de tamaño bastante uniforme- predominan ampliamente aquellos de talla menor a los 22 cm, dentro de un rango que no alcanzaría los 27 cm. Considerando el tamaño máximo alcanzable por esta especie en este contexto (29cm) y la talla promedio registrada (20cm) (YPF, 2009), no se puede sostener que el rango de tamaños sea reducido.

DISCUSIÓN

La diversidad taxonómica en conjuntos culturales puede ser baja o alta dependiendo del método y área de pesca (Zohar *et al.*, 2001). En nuestro caso, ambos conjuntos comparten una baja diversidad taxonómica, coincidiendo con la baja diversidad natural de Llananelo. La especie encontrada en el depósito natural actual no refleja la fauna más litoral ni abundante de la laguna (YPF, 2009), aunque sí la de mayor tamaño. El taxón registrado en Llan 50 representa el potencialmente consumible más abundante y accesible en la zona. Si los especímenes indeterminados dieran cuenta de otra especie, esto sería un elemento a favor del

origen cultural de Llan 50.

La representación de elementos esqueléticos en Llan 50 se diferencia de la registrada en depósitos naturales fósiles, donde los esqueletos aparecen relativamente completos, con una representación semejante del postcráneo y el cráneo (Stewart 1991, Zohar *et al.* 2001). La proporción de segmentos corporales estimada para Llan 50 puede responder a una menor preservación de los huesos craneales en el conjunto arqueológico. Sin embargo, la presencia de esqueletos incompletos coincide con lo esperado para conjuntos culturales (Stewart, 1991; Butler, 1993; Zohar *et al.*, 2001).

Los restos ictioarqueológicos presentan pocas evidencias atribuibles a la acción humana, característica habitual en este tipo de registro (Colley, 1990; Stewart, 1991; Butler, 1996, entre otros). Las señales de combustión son tomadas como indicadores válidos de actividad humana (Stewart y Gifford-Gonzalez, 1994; Zohar *et al.*, 2001), aunque no permitirían por sí mismas aseverar un origen antrópico (Butler, 1996; Bennett, 1999). Sin embargo, la presencia de restos calcinados hasta en los niveles más profundos y de no termoalterados en los superiores se opondrían a la posibilidad de un fuego superficial.

La alta densidad de restos de peces de Llan 50 contrasta con la de otros sitios en la misma zona (Corbat 2011) y no coincide con la situación analizada a partir del evento de varamiento de percas. Si bien se ha planteado una alta densidad en contextos naturales de pozas de marea (Van Neer, 1993, citado en Zohar *et al.*, 2001), el emplazamiento de Llan 50 y su contexto depositacional no lo asocian con un área sumergida.

La restricción de tamaño en Llan 50 se relacionaría con el taxón involucrado, no correspondiendo a la especie más grande disponible en los pozos actualmente: la perca. El rango restringido en el conjunto natural de perca puede estar reflejando un sesgo a favor de las especies más grandes (Stewart, 1991) y permite sostener que la baja variabilidad en los tamaños corporales no es exclusiva de los conjuntos antrópicos. Observaciones de Stewart (1991) y Van Neer (citado por Zohar *et al.* 2001) sobre conjuntos naturales –donde señalan tamaños exclusivamente grandes o pequeños, respectivamente- apoyan esta idea.

CONCLUSIONES

A partir del análisis comparativo entre el conjunto natural y arqueológico de peces se puede concluir:

1. La diversidad taxonómica no ofrece buenas condiciones para la diferenciación de depósitos naturales de los culturales –tal como se desprende también de otros estudios (Zohar *et al.*, 2001)-, y menos aún en contextos como el de nuestra área de estudio, donde la diversidad potencial de especies es baja y existe una gran proporción de elementos indeterminados.

2. La representación diferencial de los elementos esqueléticos, las señales de combustión y la densidad de hallazgos en Llan 50 sugerirían un origen antrópico para el conjunto ictioarqueológico.

3. Los conjuntos ictiofaunísticos de *Percichthys trucha* con baja densidad de especímenes, incluyendo la representación de diferentes unidades anatómicas de individuos de tamaños grandes, constituyen potencialmente depósitos naturales en Llanquanelo. Conocer en qué medida estos depósitos se ven transformados con el paso del tiempo o varían estacionalmente requiere de estudios específicos (experimentaciones, observaciones, excavaciones de depósitos naturales del pasado) que, si bien enriquecerían nuestras interpretaciones, exceden los alcances del presente trabajo.

4. Resta profundizar las diferencias conductuales entre la especie más representada arqueológicamente (de comportamiento gregario) y la perca.

5. La baja variabilidad de tamaños en un conjunto íctico no puede ser atribuida únicamente a pautas culturales. La evidencia del depósito natural de Llanquanelo permite sostener que no todos los conjuntos con individuos de tamaño relativamente uniforme son producto de la acción humana.

AGRADECIMIENTOS:

A CONICET; A. Gil y F. Zangrando; M. Giardina, G. Neme, L. Salgán, Familia Pérez y al resto del equipo del Museo de Historia Natural de San Rafael; A. L. Orquera, Martín Palma, C. Llano, Mary y la familia Franchetti. A los evaluadores.

BIBLIOGRAFÍA

- Behrensmeyer, A. y D. Dechant Boaz.** 1980. "The recent bones of Amboseli Park, Kenya". En *Fossils in the making: Vertebrate taphonomy and paleoecology*, editado por A. Behrensmeyer y A. Hill, pp: 72-92. University of Chicago Press, Chicago.
- Bennett, J.** 1999. "Thermal Alteration of Buried Bone". *Journal of Archaeological Science* 26: 1-8.
- Butler, V.** 1993. "Natural versus cultural salmonid remains: origin of the Dalles Roadcut Bones, Columbia River, Oregon, USA". *Journal of Archaeological Science* 20: 1-24.
- Butler, V.** 1996. "Tui Chub Taphonomy and the Importance of Marsh Resources in the Western Great Basin of North America". *American Antiquity* 61 (4): 699-717.
- Colley, S.** 1990. "The analysis and interpretation of archaeological fish remains". En *Advances in Archaeological Method and Theory* 2, editado por M. Schiffer, pp: 207-253. Academic Press, San Diego.
- Corbat, M.** 2011. **¿Peces nativos o exóticos? Aportes de la zooarqueología a la biología de la conservación en Laguna Llanquanelo.** *Actas de las VIII Jornadas de Arqueología de la Patagonia*, Malargüe. En prensa.
- Giardina, M., G. Neme y A. Gil.** 2011. Evaluación de impacto arqueológico Proyecto exploratorio Cerro Pozo, Área de concesión Llan. R, YPF S.A. Manuscrito en posesión del autor.
- Mac Donagh, E. y A. Thormählen.** 1945 "Observaciones sobre las especies de truchas criollas". *Revista del Museo de La Plata (nueva serie)*, IV (Zoología 27): 139-193.
- Stewart, K.** 1991. "Modern Fishbone Assemblages at Lake Turkana, Kenya: A Methodology to Aid in Recognition of Hominid Fish Utilization". *Journal of Archaeological Science* 18: 579-603.
- Stewart, K. y D. Gifford-Gonzalez.** 1994. "An ethnoarchaeological contribution to identifying hominid fish processing sites". *Journal of Archaeological Science* 21: 237-248.
- Svoboda, A.** 2013. "Disponibilidad cárnica, rendimiento energético y estimación de la talla de *Percichthys trucha* (perca criolla) a partir de la morfometría de huesos diagnósticos y su aplicación a los conjuntos ictioarqueológicos de Patagonia central". *Cuadernos de Antropología* 9: 251-266.
- Wheeler, A. y A. Jones.** 1989. *Fishes*. Cambridge University Press, Cambridge.
- YPF.** 2009. *Estudio ambiental de la totalidad del área Llanquanelo*. Unidad Económica Mendoza.
- Zohar, I., T. Dayan, E. Galili y E. Spanier.** 2001. "Fish Processing During the Early Holocene: A Taphonomic Case Study from Coastal Israel". *Journal of Archaeological Science* 28: 1041-1053.
- Zohar, I., M. Belmaker, D. Nadel, S. Gafny, M. Goren, I. Hershkovitz y T. Dayan.** 2008. "The living and the dead: How do taphonomic processes modify relative abundance and skeletal completeness of freshwater fish?". *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 258: 292-316.