



NUESTRAS AVES

48

Año XX
Diciembre de 2004
ISSN 0326-7725



AVES ARGENTINAS
Asociación Ornitológica del Plata

REVISTA DE AVES ARGENTINAS / ASOCIACION ORNITOLOGICA DEL PLATA
Para quienes disfrutan de las aves silvestres en libertad





REGISTRO DE CHARLATÁN (*Dolichonyx oryzivorus*) EN LA RESERVA COSTANERA SUR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Martín A. Carrizo y Julia Pizá

F. Sánchez 1.138, (8.000) Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: marcarrizo@yahoo.com.ar.

El 12 de abril de 2003 en la Reserva Ecológica Costanera Sur observamos y fotografiamos un individuo de charlatán. Se trataba de un macho con plumaje nupcial que se desplazaba entre un grupo de cortaderas (*Cortaderia selloana*). Fue observado desde un terraplén, a pocos metros del lugar conocido en la reserva como «punto de encuentro».

Dolichonyx oryzivorus es una especie típica de pasital que nidifica en el hemisferio norte y emigra hacia el sur. Llega a nuestro país en los meses de primavera y verano. Su presencia es considerada ocasional para la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993) y no ha sido registrada para la Reserva (Babarskas y Zelaya, 1994; Narosky *et al.*, 1996). No obstante, dado que esta es-

pecie se comercializa en la zona, esta cita podría corresponder a un ejemplar escapado (A. Di Giacomo, com. pers.).

BIBLIOGRAFÍA CITADA:

- BABARSKAS, M. y D. ZELAYA. 1994. Las aves de la Reserva Costanera Sur. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 11 páginas.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 127 páginas.
- NAROSKY, T., C. HENSCHKE y D. YZURIETA. 1996. Aves de Costanera Sur y Ciudad de Buenos Aires. Guía para su reconocimiento. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 71 páginas.

Recibida: agosto 2003

SOBRE LA PRESENCIA DE LA PARDELA GRANDE (*Calonectris diomedea*) EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Nicolás Rey

Conservación Argentina. Universidad Maimónides (Centro de Estudios Ambientales). Hidalgo 775. C1405BCK. Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: nikorey2@hotmail.com

El 24 de diciembre de 1986 mientras recorría las playas de la localidad bonaerense de Pinamar luego de una fuerte tormenta, tuve la oportunidad de observar durante varios minutos a un ave que resaltaba entre un grupo de unos 20 gaviotines (*Sterna* sp.). Si bien su aspecto general parecía al de un juvenil de gaviota cocinera (*Larus dominicanus*), presentaba ranfoteca dividida y un par de tubos nasales en la base de la maxila, rasgos característicos de un ave del orden Procellariiformes.

Describo las características más sobresalientes. Pico amarillento y patas liláceas. Dorsal pardo más oscuro en alas y cola, ventral blanco, delgada rabadilla blanca en «V» (sólo notable a corta distancia). Pensé que podría tratarse del frecuente petrel gris (*Procellaria cinerea*), pero el blanco ventral de las alas,

el pico amarillento (y no verdoso) y la inconspicua rabadilla blanca fueron caracteres que me permitieron asignarlo como *Calonectris diomedea*.

Esta pardela nidifica en el hemisferio boreal. Durante la época post-reproductiva suele realizar grandes desplazamientos hasta las costas de Brasil, Uruguay y la Argentina. Belton (1984) la considera una especie pelágica accidental para Río Grande do Sul. Aspiroz (1997) considera que la especie es rara y visitante estival en Uruguay.

El primer registro publicado para la Argentina corresponde a un ejemplar hallado muerto en las playas de San Clemente del Tuyú en enero de 1970 (Narosky, 1971). Posteriormente, fue señalada para las costas bonaerenses por Cooke y Mills (1972) y por Olrog (1974). Durante mucho tiempo estos fue-