

Lycalopex gymnocercus* (G. Fischer)*Zorro pampa**

M. Di Bitetti, C. De Angelo, N. Muzzachiodi, M. Lucherini,
A. Paviolo y L. Soler

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global UICN 2011: LC

Comentarios: Especie adaptable y generalista que prefiere pastizales o ambientes de sabanas arbustivas (Lucherini y Luengos Vidal, 2008). Parece tener una alta tasa reproductiva y puede alcanzar densidades relativamente altas (a pesar de que existe una sola estimación de densidad confiable: 1,5 ind/km² en un área protegida de la región pampeana; Luengos Vidal et al., 2012). Esta especie podría incluso estar aumentando su área de ocupación en la Argentina, ya que aprovecha muchas de las áreas de bosque que han sido o están siendo convertidas a agricultura. Por ejemplo, el zorro pampa es muy frecuente en áreas de plantaciones de caña de azúcar o de cítricos ubicadas en áreas Selva Pedemontana de Yungas (que no constituye un hábitat adecuado para esta especie) y que fueron convertidas a tal fin (Di Bitetti et al., datos no publicados). Es una especie relativamente tolerante a la presencia del hombre, donde podría tener cierta ventaja competitiva sobre el zorro de monte (*Cerdocyon thous*) (ej. ver Crespo, 1971). Sin embargo, hay datos de la región pampeana que sugieren que hay un límite a su capacidad de adaptarse a las alteraciones humanas y que el efecto combinado de destrucción de los hábitats naturales y la caza (tanto por su piel como por su depredación sobre el ganado) puede llevar a extinciones locales (Luengos Vidal, 2009; Bustamante et al., 2010).

Lycalopex griseus* (Gray)*Zorro gris, zorro chillá**

M. Lucherini

Categoría Nacional 2012: LC

Categoría Nacional 1997 y 2000: LC

Categoría Global UICN 2011: LC