

REGISTROS NOVEDOSOS

SAÍRA CASTAÑA (*Stilpnia preciosa*) EN LA COSTA DEL RÍO PARANÁ,
ENTRE RÍOS, ARGENTINA

CHESTNUT-BACKED TANAGER (*Stilpnia preciosa*) IN PARANA RIVER, ENTRE RÍOS, ARGENTINA

MATÍAS J. ALMEIDA^{1*} & MALENA MAROLI²

¹ Administración de Parques Nacionales. Parque Nacional Predelta. 3 de Febrero 394, Diamante (3105), Entre Ríos, Argentina.

² CICYTTP (CONICET -Prov. ER-UADER). Dr. Matteri y España (3105), Diamante, Entre Ríos, Argentina.

*matijalmeida@gmail.com

RESUMEN: En agosto de 2020 registramos un macho de Saíra Castaña (*Stilpnia preciosa*) en la Reserva Natural Urbana de Diamante, Entre Ríos, Argentina. Este registro, de presencia actual sobre la costa del río Paraná inferior en la provincia de Entre Ríos, permite retomar una controversia histórica sobre los registros más occidentales para la especie.

PALABRAS CLAVE: Saíra Castaña (*Stilpnia preciosa*), Thraupidae, distribución, Argentina.

ABSTRACT: In August 2020, we recorded a male Chestnut-backed Tanager (*Stilpnia preciosa*) in Diamante Urban Natural Reserve, Entre Ríos, Argentina. This record of current presence on the coast of the lower Paraná River in the province of Entre Ríos, allows us to revisit a historical controversy about the westernmost records for the species.

KEYWORDS: Chestnut-backed tanager (*Stilpnia preciosa*), Thraupidae, distribution, Argentina.

La Saíra Castaña (*Stilpnia preciosa*) es una especie que se distribuye en el sudeste de Brasil, este de Paraguay y en Uruguay (eBird 2020; Hilty 2020). En Argentina se encuentra en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos (Olrog 1979; Canevari et al. 1991; De la Peña 2015; López-Lanús 2020). En estas dos últimas provincias se distribuye exclusivamente sobre el río Uruguay, llegando regularmente hasta el centro-este de Entre Ríos (De la Peña 2006; Joonas y Ortíz 2009; Marateo et al. 2009). Si bien la especie llega regularmente hasta Entre Ríos, esta cuenta con registros actuales más al sur en Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993; Pagano et al. 2012; Malagisi & Quintela 2019). El 14 de agosto de 2020, a las 17:11 h, en la Reserva Natural Urbana de Diamante, Entre Ríos (32°3'S, 60°38'O; 48 msnm) observamos, filmamos y fotografiamos un ejemplar macho de Saíra Castaña junto a una bandada de Celestinos (*Thraupis sayaca*; eBird: Almeida 2020). Esta bandada mixta estaba posada en un Chañar (*Geoffroea decorticans*) con hemiparásitas de rama de la Familia Loranthaceae. El ejemplar de Saíra Castaña se mostró confiado y pasivo (Figs. 1 & 2). Lo observamos durante 5 min, tiempo durante el cual sólo vocalizó en dos ocasiones. La Reserva Natural Urbana de Diamante se ubica al noroeste de la ciudad homónima, en el límite de los cursos medio e inferior del río Paraná. Conserva relictos de bosque de barranca con ejemplares de Quebracho Blanco (*Aspidosperma quebracho-blanco*), Tala (género *Celtis*), Ombú (*Phytolacca dioica*) y mirtáceas, cuatro especies del género *Acacia* y tres de *Prosopis* sp., además de especies exóticas para la región como la Tipa Blanca (*Tipuana tipu*) y el Jacarandá (*Jacaranda mimosifolia*). Intentando localizar los registros más australes y occidentales de esta especie surge una controversia, ya que el primer registro para Argentina es citado en Estancia Santa Elena (Holland 1896). Algunos autores han ubicado este lugar en Santa Elena, provincia de Entre Ríos (Camperi 1992) y otros en los partidos de General Pinto y quizás Ameghino, provincia de Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993). Si el dato de Camperi (1992) es certero, el presente registro sería el más occidental de la especie y el más



Figura 1: Individuo de Saíra Castaña (*Stilpnia preciosa*) observado en el mes de agosto de 2020 posado sobre un chañar (*Geoffroea decorticans*) en la Reserva Natural Urbana de Diamante, Diamante, Entre Ríos, Argentina. Fotografía: Almeida MJ.




Figura 2: Individuo de Saíra Castaña (*Stilpnia preciosa*) observado en el mes de agosto de 2020 posado sobre un chañar (*Geoffroea decorticans*) en la Reserva Natural Urbana de Diamante, Diamante, Entre Ríos, Argentina. Fotografía: Almeida MJ.

austral para la costa del río Paraná. Si, por el contrario, Narosky & Di Giacomo (1993) son quienes aportan la información certera sobre la localización de la Estancia Santa Elena en Buenos Aires, nuestro registro sería el primero para la provincia de Entre Ríos en la costa del río Paraná. Este registro de Saíra Castaña en Diamante es un dato actual de presencia que puede aportar información útil para dilucidar esta controversia histórica sobre el extremo de distribución occidental de la especie.

REFERENCIAS

- ALMEIDA M. (2020). eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S72409937>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (14/08/2020).
- CAMPERI AR. (1992). Estudio de una colección de aves de la provincia de Entre Ríos. *El Hornero*, 13: 225-229.
- CANEVARI M, CANEVARI P, CARRIZO GR, HARRIS G, RODRÍGUEZ MATA J & STRANECK R. (1991). Nueva guía de las aves argentinas. Tomo 1. Fundación Acindar, Buenos Aires.
- DE LA PEÑA MR. (2006). Nueva lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Monografía 15. L.O.L.A. Buenos Aires.
- DE LA PEÑA MR. (2015). Aves argentinas. Tomo 2. Incluye nidos y huevos. Ediciones UNL. Santa Fe.
- eBIRD. (2020). Mapa de distribución de Saíra castaña (*Stelpnia preciosa*). eBird, Ithaca. Available: <https://ebird.org/species/chbtan1/AR> (03/09/2020).
- HILTY S. (2020). Chestnut-backed Tanager (*Stelpnia preciosa*), versión 1.0. en Del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J, Christie DA & de Juana E (eds). *Birds of the World*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- HOLLAND AH. (1896). Field-notes on the Birds of the Estancia Sta Elena, Argentine Republic. Part III. With remarks by PL. Sclater. *Ibis*, 1896: 315-318.
- JOONAS A & ORTÍZ D. (2009). Primer registro documentado de la Saíra Castaña (*Tangara preciosa*) para Entre Ríos, Argentina. *Nuestras Aves*, 54: 42-43.
- LÓPEZ-LANÚS B. (2020). Guía Audiornis de las aves de Argentina; identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. 4ta edición ampliada. Audiornis Producciones. Buenos Aires.
- MALAGISI BD & QUINTELA F. (2019). Saíra Castaña (*Stelpnia preciosa*) en Punta Indio, Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 64: 30-31.
- MARATEO G, POVEDANO H & ALONSO J. (2009). Inventario de las aves del Parque Nacional El Palmar, Argentina. *Cotinga*, 31: 47-60.
- NAROSKY T & DI GIACOMO AG. (1993). Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vazquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Bs. As.
- OLROG CC. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.
- PAGANO LG, JORDAN EA, ARETA JI, JENSEN RF & ROESLER I. (2012). Aves de La Reserva Natural Punta Lara. En Roesler I & Agostini MG (eds). *Inventario de los Vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara*, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Temas de Naturaleza y Conservación. Monografía de Aves Argentinas No. 8*. Bs. As.