

## Sesiones de Posters

---

### **Propiedades psicométricas del Psychopathic Personality Traits en adultos internos de penitenciarias**

Resett, Santiago<sup>\*a</sup>; Rodriguez, Lucas Marcelo<sup>a, b</sup>

<sup>a</sup> Universidad Católica Argentina, Paraná, Argentina

<sup>b</sup> CONICET, Paraná, Argentina

\*resettsantiago@gmail.com

#### **RESUMEN**

**Introducción:** la psicopatía es un importante constructo, pero cuya operacionalización genera confusión en la comunidad científica debido a que se lo ha asimilado con el trastorno de la conducta antisocial. Boduszeck et al. (2016) desarrollaron el Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) para medir la psicopatía a partir de una evaluación basada puramente en la psicopatía y sin ningún indicador comportamental. En los países de la América Latina, como la Argentina, la psicopatía ha sido escasamente estudiada en los internos de unidades penitenciarias. **Objetivos:** examinar la estructura del PPTS y su consistencia interna y determinar si los rasgos de la personalidad psicopática eran un predictor del bullying en adultos varones reclusos en penitenciarias. **Método:** una muestra de 328 internos masculinos de penitenciarias de la Argentina (edad media = 34,44) contestaron dicha escala que se compone de 28 preguntas con cinco alternativas de respuesta y la Escala de Bullying de Ireland. **Resultados:** arrojaron un KMO = 0,87 y prueba de Bartlett  $\chi^2(378) = 2687,07$   $p = 0,001$  que explicaban una varianza del 49%, con una estructura similar a la del autor de cuatro dimensiones (falta de

responsabilidad afectiva, falta de responsabilidad cognitiva, manipulación interpersonal y egocentrismo). Las alfas de Cronbach para la falta de responsabilidad afectiva era 0,68; para la falta de responsabilidad cognitiva el valor era 0,69; para manipulación interpersonal era 0,79 y para egocentrismo era 0,72, mientras que los valores Omega de McDonalds se hallaban por encima de .70 para todas las subescalas. Los puntajes del PPTS predecían las formas de bullying con  $R^2 = 17\%$ ,  $19\%$ ,  $13\%$  y  $21\%$ , para bullying físico, verbal, a la propiedad e indirecto, respectivamente. **Discusión:** el PPTS presentaría evidencia de adecuadas propiedades psicométricas, como lo indican la predicción de todas las formas de bullying, y un avance en la medición de la psicopatía.

*Palabras Clave:*

psicopatía; PPTS; rasgos; penitenciarias.

### **Higiene de sueño y consumo de sustancias tóxicas en músicos de rock**

Saavedra, Antonella<sup>a</sup>; Resett, Santiago<sup>\*a, b</sup>

<sup>a</sup> Universidad Argentina de la Empresa, Buenos Aires, Argentina

<sup>b</sup> CONICET, Buenos Aires, Argentina

\*resettsantiago@gmail.com

#### **RESUMEN**

**Introducción:** la higiene de sueño es un importante constructo psicosocial, principalmente en poblaciones que llevan a cabo trabajos por la noche. Pocas investigaciones se han realizado a este respecto en músicos de rock argentinos. **Objetivos:** analizar si existía una relación entre la higiene del

grupo experimental en comparación al grupo control, que se atribuye a un fenómeno emocional análogo a la frustración. Nuestro objetivo fue analizar si la discrepancia entre la recompensa obtenida en ambas fases afectaba la aparición o la magnitud del fenómeno de contraste modificando la cantidad de ensayos totales. **Metodología:** Se entrenaron ratas Long Evans en una tarea de CNS instrumental en un corredor recto, con un esquema de ensayos masivos (4 por sesión diaria) y diferentes proporciones de recompensa entre etapas. En un primer experimento, se utilizaron 16, 8 o 4 pellets como recompensa grande, y 1 pellet como recompensa pequeña, obteniendo proporciones de 16:1, 8:1 y 4:1 entre etapas, en una condición de 6 sesiones pre-cambio y 6 post-cambio. En un segundo experimento, se utilizaron 16 pellets como recompensa grande y 2 pellets como recompensa pequeña, manteniendo la proporción 8:1, en una condición de 12 sesiones pre-cambio y 6 post-cambio. **Resultados:** Se observó que los parámetros utilizados en el segundo protocolo mejoraron la expresión del fenómeno de CNSi. **Discusión:** Se destaca que la aparición del fenómeno puede cambiar duplicando los ensayos de práctica con la recompensa grande, aún con una misma proporción entre etapas.

*Palabras Clave:*  
contraste negativo sucesivo, mamíferos, frustración

### **Diferencias en indicadores de uso de alcohol y marihuana entre universitarios/as con consumo exclusivo de alcohol y co-uso de alcohol y marihuana**

Luque, Maribel<sup>a, b</sup>; Aguirre, Paula<sup>a, b</sup>; Bruzzone, Manuel<sup>a, b</sup>; Michelini, Yanina<sup>a, b</sup>; Pilatti, Angelina<sup>a, b</sup>

<sup>a</sup> Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Psicología, Córdoba, Argentina

<sup>b</sup> Instituto de Investigaciones Psicológicas, IIPsi-CONICET-UNC, Córdoba, Argentina

\*[maribel.luque@mi.unc.edu.ar](mailto:maribel.luque@mi.unc.edu.ar)

### **RESUMEN**

**Introducción.** El uso simultáneo de alcohol y marihuana (SAM; uso de ambas sustancias de manera que sus efectos se superpongan) en jóvenes universitarios/as parece estar asociado a mayor consumo de alcohol y marihuana y mayores problemas asociados que el uso exclusivo o por separado de estas sustancias. Sin embargo, los estudios locales que examinan estos comportamientos aún son escasos o fueron realizados en muestras de tamaño pequeño.

**Objetivo.** Examinar diferencias en la frecuencia y cantidad de consumo de alcohol y marihuana, y sus consecuencias negativas, en función de la modalidad de consumo de sustancias en estudiantes universitarios/as argentinos/as. **Metodología.**

Participaron 1695 estudiantes (69.9% mujeres; Media edad = 20.91±2.17) que completaron una encuesta online que midió frecuencia y cantidad de consumo de alcohol y marihuana y problemas asociados a estos consumos en los últimos 90 días.

**Resultados.** Del total de participantes, el 46% reportó consumir exclusivamente alcohol (ALC), el 34.2% reportó al menos un episodio de uso SAM, el 8.9% reportó consumir alcohol y marihuana en ocasiones diferentes (CAM), el 0.9% reportó consumir exclusivamente marihuana y el 10% reportó no consumir alcohol o marihuana (estos dos últimos grupos no se incluyeron en los análisis comparativos). SAM, comparado con CAM y ALC, reportó significativamente mayor frecuencia y cantidad (durante una semana típica) y mayor cantidad de problemas asociados. A su vez, la frecuencia y la cantidad (durante una semana típica) de consumo de marihuana y la cantidad de problemas asociados fueron significativamente mayores en SAM que en CAM. **Discusión:** Estos resultados, en línea con hallazgos previos, sugieren que universitarios/as que exhiben una modalidad de

consumo que combina, en una misma ocasión, el uso de alcohol y de marihuana presentan mayor vulnerabilidad a presentar consumo problemático (intensivo, asociado a consecuencias negativas) de estas sustancias que quienes las consumen exclusivamente o separadamente.

*Palabras Clave:*

frecuencia, consecuencias, uso simultáneo de alcohol y marihuana, adultez emergente

## Diferencias en indicadores de consumo de alcohol y marihuana entre universitarios/as y no universitarios/as argentinos/as

Luque, Maribel<sup>\*, a, b</sup>; Bruzzone, Manuel<sup>a, b</sup>; Michelini, Yanina<sup>a, b</sup>; Pilatti, Angelina<sup>a, b</sup>

<sup>a</sup> Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Psicología, Córdoba, Argentina

<sup>b</sup> Instituto de Investigaciones Psicológicas, IIPsi-CONICET-UNC, Córdoba, Argentina  
[\\*maribel.luque@mi.unc.edu.ar](mailto:maribel.luque@mi.unc.edu.ar)

### RESUMEN

**Introducción:** Los cambios en las condiciones de vida durante la universidad pueden generar estrés, contexto que parece favorecer el inicio y escalada de consumo de alcohol (CA) y/o marihuana (CM). A diferencia de los/as universitarios/as (UNIV), quienes no asisten a la universidad (NO-UNIV) usualmente destinan mayor tiempo a obligaciones familiares/laborales y pasan menos tiempo con sus pares. Estos distintos escenarios parecen asociarse diferencialmente al CA y CM. **Objetivo:** Examinamos: 1-la ocurrencia de consumo exclusivo de alcohol (ALC) o marihuana (MAR), CA y CM en ocasiones separadas (uso CAM) y el uso simultáneo de ambas sustancias (SAM) en jóvenes (18-26 años) y 2-variaciones en el CA y CM entre UNIV y NO-UNIV. **Metodología:** Participaron 624 jóvenes (67.1% mujeres; Media edad= 20.94±2.62); 384 UNIV; 240 NO-UNIV) que completaron una encuesta online que midió indicadores de CA y CM (frecuencia y cantidad) en los últimos 90 días. **Resultados:** El

11.1% reportó no haber consumido ninguna sustancia (12.5% NO-UNIV, 9.9% UNIV), el 43.3% se ubicó en el grupo ALC (40.9% No-UNIV, 45.3% UNIV), el 1.6% en MAR (2.5% NO-UNIV, 0.9% UNIV), el 9.6% se ubicó en CAM (8.2% NO-UNIV, 10.8 UNIV) y el 34.3% en SAM (35.9% NO-UNIV, 33% UNIV). La ocurrencia de diferentes indicadores de CA y CM fue similar entre UNIV y NO-UNIV, salvo la del consumo de >15 medidas por ocasión (24.9% NO-UNIV, 13.5% UNIV;  $\chi^2=13.37[p<.05]$ ). Se observaron diferencias significativas ( $t>1.53$ ;  $p<.05$ ) todos los indicadores de frecuencia y cantidad de CA y CM que muestran un mayor consumo en NO-UNIV versus UNIV. **Discusión:** Los resultados manifiestan alta ocurrencia de CA y CM, particularmente de uso SAM, en población joven. Asimismo, sugieren que quienes no asisten a la universidad parecen más vulnerables a consumir alcohol y marihuana que sus pares universitarios/as, destacando la necesidad de brindar asistencia adecuada dicho grupo.

*Palabras Clave:*

adultez emergente, universitarios y no universitarios, consumo simultáneo de alcohol y marihuana, frecuencia

## Consumo de alcohol en relación a los contextos de consumo y la edad de inicio en ciudadanos/as uruguayos/as

Agostina Barey<sup>\*, a</sup>; Paul Ruiz<sup>b</sup>; Ricardo Marcos Pautassi<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Instituto de Investigación Médica M. y M. Ferreyra (INIMEC – CONICET-Universidad Nacional de Córdoba).

<sup>b</sup> Departamento de Biociencias, Facultad de Veterinaria, UdelaR, Uruguay  
[\\*abarey@immf.uncor.edu](mailto:abarey@immf.uncor.edu)

### RESUMEN

**Introducción:** El consumo de alcohol (CA) en Uruguay ha sido históricamente superior al de otros países latinoamericanos, por lo que es importante detectar variables que lo promueven. Los contextos físicos y sociales en que tiene lugar el CA, así como la edad de inicio de consumo, son factores determinantes de esta conducta; y pueden asociarse