



- DE LA PEÑA MR (2013) *Nidos y reproducción de las aves argentinas*. Ediciones Biológica, Santa Fe
- DICKENS JK, COSTA TV, FROS HD & FONTCUBERTA E (2015) First nesting record of Band-winged Nightjar *Systemellura longirostris* in Uruguay. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 135:278–280
- DINAMA (2009) *Propuesta de proyecto de creación y delimitación de un área protegida en las cuencas de los arroyos Laureles y de las Cañas para su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas*. MVOTMA / DINAMA / SNAP, Montevideo
- MAURICIO GN (2011) The Orange-breasted Thornbird (*Phacelodorus ferrugineigula*) (Furnariidae): a new effective host of Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*) (Icteridae). *The Wilson Journal of Ornithology* 123:416–417
- RIVERO PA & AZPIROZ AB (2018) Ensamblajes de aves de la Cuchilla de Laureles: un área prioritaria para la conservación en los Campos del Norte de Uruguay. *Ornitología Neotropical* 29:59–70
- SIMON JE, PACHECO JF, WHITNEY BM, DE MATTOS GT & GAGLIARDI RL (2008) *Phacelodorus ferrugineigula* (Pelzeln, 1858) (Aves: Furnariidae) é uma espécie válida. *Revista Brasileira de Ornitologia* 16:107–124
- IUCN (2018) *Limnoctites rectirostris*. IUCN Red List of Threatened Species, Cambridge [URL: <https://www.iucnredlist.org/species/22702652/93885012>]
- YANOSKY AA (1987) Acerca del nido del Jote de Cabeza Amarilla *Cathartes burrovianus* (Aves, Cathartidae). *Nótulas Faunísticas* 5:1

Recibido: octubre 2018 / Aceptado: noviembre 2018 / Publicado: diciembre 2018

Nuestras Aves 63: 48-50, 2018

## LA VIUDITA ENMASCARADA (*Fluvicola nengeta*) LLEGA A LA PROVINCIA DE CORRIENTES

*Nestor Fariña<sup>1</sup> y Martjan Lammertink<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>Reserva Natural Provincial Rincón de Santa María, Dirección de Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes, Av. La Rioja N° 454, Corrientes (3400), Corrientes, Argentina. Correo electrónico: nestor\_spm@yahoo.com.ar

<sup>2</sup>CICYTTP-CONICET, Matteri y España s/n, Diamante (3105), Entre Ríos, Argentina / Cornell Lab of Ornithology, 159 Sapsucker Woods Road, Ithaca, NY 14850, EE.UU.

La Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) se distribuye en el nordeste y sur de Brasil, en Paraguay, y dentro de Argentina, en Misiones (BirdLife International 2018). Es un tiránido característico por su coloración mayormente blanca, que contrasta con partes oscuras tales como: una notable y delgada faja color negro en la base del pico, que se extiende hasta la región auricular donde se curva levemente hacia abajo; alas pardas oscuras; espalda gris pálido; y las timoneras negras con los ápices blancos. Estas características distinguen a la Viudita Enmascarada de otros tiránidos similares que cuentan con registros en la provincia de Corrientes, como la Monjita Dominicana (*Xolmis dominicanus*), la Viudita Blanca (*Fluvicola albiventer*), la Monjita Blanca (*Xolmis irupero*) y la hembra de Lavandera (*Arundinicola leucocephala*).

La Viudita Enmascarada está experimentando un proceso de expansión geográfica que data de la década de 1950, cuando la especie habría comenzado a expandirse hacia el sur de su distribución original, primero con registros en Río de Janeiro (Sick 1997), luego en San Pablo (Alvarenga 1990, Willis 1991) y en el estado de Paraná (Scherer Neto & Carrano 1998), posteriormente en Mato Grosso do Sul

y Santa Catarina (Straube et al. 2007), y recientemente en Rio Grande do Sul (Meller et al. 2018). En Argentina, la Viudita Enmascarada era considerada Insuficientemente Conocida (López-Lanús et al. 2008), conceptualizada como rara o accidental (Chebez 2009); sin embargo, recientemente fue categorizada como No Amenazada teniendo en cuenta su plasticidad en cuanto al uso de hábitats antrópicos (MAyDS & AA 2017). En esta nota compilamos los registros publicados e inéditos de la Viudita Enmascarada en Argentina (Fig. 1) y reportamos a la especie por primera vez para la provincia de Corrientes.

La Viudita Enmascarada fue citada por primera vez en Argentina en marzo de 2002, mediante un registro en el Parque Provincial Esmeralda, departamento San Pedro, Misiones (Krauczuk et al. 2003). El segundo registro fue en octubre de 2005 en el Parque Provincial Moconá, departamento San Pedro, a 29 km del anterior (Klavins & Bodrati 2007). A partir de 2010 la especie comenzó a registrarse en el norte de Misiones, primero en el Parque Nacional Iguazú (Militello et al. 2010), y a partir de 2012 los registros en Misiones comenzaron a suceder de forma más frecuente. Es así que en la actualidad, la Viudita En-



**Figura 1.** Distribución de la Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) y localidades en Argentina. En gris se representa la distribución según BirdLife International (2018). Los círculos negros (1-5) son registros publicados previamente (eBird 2018), y los círculos blancos (6-7) son las localidades reportadas por primera vez en este trabajo: 1) Parque Provincial Esmeralda (San Pedro, Misiones); 2) Parque Provincial Moconá (San Pedro, Misiones); 3) Parque Nacional Iguazú (Iguazú, Misiones); 4) Reserva Privada San Sebastián de la Selva (General Manuel Belgrano, Misiones); 5) Complejo La Aventura y Reserva Urbana Arroyo Itá (Posadas, Misiones); 6) Reserva Natural Rincón de Santa María (Ituzaingó, Corrientes); y 7) Balneario Municipal Parque Provincial Cuiña Pirú (Caingúas, Misiones).

mascarada ya cuenta con múltiples registros en la Reserva Privada San Sebastián de la Selva, departamento General Manuel Belgrano, en donde incluso la especie nidifica (La Grotteria et al. 2012, eBird 2018, EcoRegistros 2018). En agosto de 2015 fue registrada en el complejo La Aventura, Posadas (Martínez & Gauna 2015), y en diciembre de ese mismo año en la Reserva Urbana Arroyo Itá (COA Tangara Posadas 2015). Adicionalmente, A Bodrati (com. pers.) observó una Viudita Enmascarada en el camino de acceso al área de acampe del Balneario Municipal, dentro del Parque Provincial Cuiña Pirú, departamento Caingúas, Misiones (27°05'S, 54°57'O), el 31 de noviembre de 2017. Este registro se produjo luego de lluvias intensas, cuando aún llovía, pero tenuemente.

La primer mención para la provincia de Corrientes que damos a conocer en esta nota corresponde a una observación en la Reserva Natural Rincón de Santa María (RNRSM). La RNRSM es un Área Importante para la Conservación de las Aves que cuenta con una superficie de 3000 ha (Krauczuk & Di Giacomo 2005), que se encuentra ubicada en el departamento de Ituzaingó, al nordeste de la provincia. El 16 de octubre de 2017 observamos durante unos pocos minutos una Viudita En-



**Figura 2.** Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*), el 16 de octubre de 2017, en la Reserva Natural Rincón de Santa María, provincia de Corrientes, Argentina. Fotografía: M Lammertink

mascarada, a las 07:25 h, en un estanque artificial de la RNRSM (27°32'S, 56°37'O; 90 m snm) que se conecta con un sistema de canales de drenaje, que se relacionan con el lago de la represa hidroeléctrica Yacyretá. La presencia constante de agua favorece la proliferación de vegetación acuática, como camalote (*Pontederia azurea*), camalotito blanco (*Nymphoides indica*), yerba de la vida (*Hydrocleys nymphoides*) y duraznillos del agua (*Ludwigia* sp.). En los bordes externos crecen pajonales y por sectores crece vegetación arbustiva rala. La Viudita Enmascarada se mostraba activa, emitiendo una voz como la mencionada por Klavins & Bodrati (2007), mientras capturaba insectos en vuelos sobre el espejo de agua y regresaba hacia la vegetación circundante, donde la fotografiamos posada en un renopal de pino (*Pinus elliotii*; Fig. 2). Los días consecutivos a la observación, regresamos al mismo estanque pero ya no la detectamos, así como tampoco la detectamos en otros sectores de la RNRSM durante todo el 2018.

La ampliación del rango geográfico de la Viudita Enmascarada en Brasil, Paraguay y Argentina se ha visto favorecida por la transformación de los ambientes naturales mediante la expansión de la frontera agrícola, forestaciones con especies exóticas, deforestación, emplazamientos de jardines en áreas urbanas, canalizaciones y drenajes de obras hidroeléctricas (Willis 1991, Sick 1993, Scherer Neto & Carrano 1998, Souza Braga 2000, Klavins & Bodrati 2007, Militello et al. 2010). Sin embargo, la presencia de esta especie en la provincia de Corrientes también podría beneficiarse de características de los ambientes naturales tales como: áreas abiertas con



vegetación palustre formadas por los numerosos esteros, bañados, lagunas arroyos y ríos que surcan la provincia. Esto también hace pensar en la posibilidad de que en tiempos no muy lejanos, la Viudita Enmascarada pueda colonizar otras regiones de la provincia, e incluso también regiones con fisonomías similares de provincias vecinas, como Entre Ríos y Chaco. Este registro para la provincia de Corrientes está 73 km al sudoeste de los registros conocidos en Posadas, Misiones y representa la localidad más occidental de la especie en la Argentina.

Agradecemos a la guardaparque Olga Villalba quien nos acompañó en el campo los días consecutivos al avistamiento de la especie. A L Pagano y A Bodrati por la información brindada y revisiones. Agradecemos a J La Grotteria, F Gorleri y a los editores de Nuestras Aves, quienes revisaron y mejoraron el manuscrito. A la Dirección de Parques y Reserva de la provincia de Corrientes, a la Entidad Binacional Yacyretá y al Fondo Canadiense para la Conservación Internacional, instituciones que aportaron recursos para el manejo de la RNRSM.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ALVARENGA HMF (1990) Novos registros de expansões geográficas de aves no leste de estado de São Paulo. *Ararajuba* 1:115–117
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2018) Species factsheet: *Fluvicola nengeta*. BirdLife International, Cambridge [URL: <http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/Masked-Water-Tyrant>]
- CHEBEZ JC (2009) *Otros que se van. Fauna argentina amenazada*. Editorial Albatros, Buenos Aires
- COA TANGARA POSADAS (2015) Lista de eBird S26133492 y S26257596. eBird: una base de datos en línea de abundancia y distribución de aves, Ithaca. [URL: <https://ebird.org/argentina/view/checklist/S26257596>]
- EBIRD (2018) eBird: una base de datos en línea para la abundancia y distribución de las aves, Ithaca [https://ebird.org/species/mawtyr1]
- ECOREGISTROS 2018. Ficha de la especie: Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*). EcoRegistros, Escobar [URL: <http://www.ecoregistros.org/ficha/Fluvicola-nengeta>]
- KLAVINS J & BODRATI A (2007) La Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*): una nueva especie para Paraguay y segundo registro para Argentina. *Hornero* 22:43–45
- KRAUCZUK E & DI GIACOMO AS (2005) Reserva Natural Rincón de Santa María. Pp. 147–148 en: DI GIACOMO AS (ed) *Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
- KRAUCZUK E, KURDAY D & ARZAMENDIA E (2003) Presencia de *Fluvicola nengeta* en la provincia de Misiones, Argentina. *Lundiana* 4:161
- LA GROTTERIA J, MOLLER JENSEN R & ALVARADO H (2012) Nuevo registro de la Viudita Enmascarada (*Fluvicola nengeta*) en Argentina. *Revista Ecoregistros* 2:1–6
- LÓPEZ-LANÚS B, GRILLI P, COCONIER E, DI GIACOMO A & BANCHS R (2008) *Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación*. Aves Argentinas/AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires
- MARTÍNEZ J & GAUNA P (2015) Lista de eBird S29927505. eBird: una base de datos en línea de abundancia y distribución de aves, Ithaca. [URL: <https://ebird.org/argentina/view/checklist/S29927505>]
- MAYDS & AA (2017) *Categorización de las aves de la Argentina*. Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- MELLER DA, BEIER C, RAUBER AM, CALLEGARO A, BOUFLEUR C, ZORZAN AC, SESSEGOLO P & RODRIGUES PB (2018) Ocorrença da Noivinha Branca (*Xolmis velatus*) e da Lavandeira Mascarada (*Fluvicola nengeta*) no Rio Grande Do Sul, Brasil. *Nuestras Aves* 63:10–13
- MILITELLO E, CHEBEZ JC & DA COSTA B (2010) Nuevo registro de la Viudita de Antifaz (*Fluvicola nengeta*) (Passeriformes: Tyrannidae) para la Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 44:1–4
- SCHERER NETO P & CARRANO E (1998) Ocorrência da lavandeira-mascarada *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766) no Estado do Paraná. *Atualidades Ornitológicas* 82:11
- SICK H (1993) *Birds in Brazil: a natural history*. Princeton University Press, Princeton
- SICK H (1997) *Ornitologia brasileira*. Nova Fronteira, Rio de Janeiro
- SOUZA BRAGA FM (2000) Ocorrência de *Fluvicola nengeta* (Tyrannidae) no reservatório de Volta Grande, Rio Grande (MG-SP). *Boletim CEO* 14:7–9
- STRAUBE FC, URBEN-FILHO A, DECONTO LR & PATRIAL EW (2007) *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766) nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e sua expansão de distribuição geográfica pelo sul do Brasil. *Atualidades Ornitológicas* 137:33–3
- WILLIS EO (1991) Expansão geográfica de *Netta erythrophthalma*, *Fluvicola nengeta* e outras aves de zonas abertas com a “desertificação” antrópica. *Ararajuba* 2:101–102

Recibido: julio 2018 / Aceptado: noviembre 2018 / Publicado: diciembre 2018